

## 除草剤

# プロールプラス<sup>®</sup> 乳剤

<sup>®</sup>=BASF社の登録商標



### 有効成分

ジメテナミドP ..... 6.7%  
 ペンディメタリン(PRTR・1種) ..... 6.5%  
 リニュロン(PRTR・1種) ..... 11.4%

登録番号：第23441号

性 状：黄赤色澄明可  
 乳化油状液体

毒 性：普通物\*

危 険 物：三石・非水溶性・Ⅲ

有効年限：3年

包 装：500ml×20本  
 5ℓ×4本

\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用雑草と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯
				薬量	希釈水量			
だいず えだまめ	一年生 雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	全土壌 (砂土を除く)	400~ 600ml /10a	70~ 150ℓ /10a	1回	全面 土壌散布	全域

ジメテナミドおよびジメテナミドPを含む農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	リニュロンを含む農薬の総使用回数
1回	1回	2回以内(全面土壌散布は1回以内、 雑草茎葉兼土壌散布は1回以内)