

除草剤

BASF バサグラン[®] 液剤

®=BASF社の登録商標



有効成分

ベンタゾン(Na塩) 40.0%

登録番号：第21254号

性 状：赤色澄明
水溶性液体

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：3ℓ×6本

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用回数*	使用方法	適用 地帯
			薬量	希釈水量			
移植水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後15~55日 但し 収穫50日前まで	500~ 700ml /10a	70~ 100ℓ /10a	2回以内	落水散布 又はごく 浅く湛水 して散布	—
直播水稻	水田一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後35~50日 但し 収穫50日前まで					

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびベンタゾンを含む農業の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数*	使用方法	適用地帯			
			薬量	希釈水量						
たまねぎ (春播移植栽培)	一年生雑草 (イネ科を除く)	移植後6月上旬まで (雑草の3~4葉期) 但し収穫30日前まで	60~ 120ml /10a	70~ 100ℓ /10a	1回	雑草 茎葉 散布	全 域			
たまねぎ (秋播移植栽培)		移植後 生葉4葉期まで (雑草の3~4葉期) 但し収穫30日前まで								
らっきょう		出芽後 (雑草の3~6葉期) 但し収穫60日前まで								
いんげんまめ		初生葉展開期~ 本葉抽出始期 (雑草の2~3葉期)	50~ 70ml /10a				100~ 200ml /10a	1回	雑草 茎葉 散布	北海道
えんどうまめ		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫70日前まで								
実えんどう さやえんどう		3~6葉期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫40日前まで	100~ 150ml /10a				1回	雑草 茎葉 散布	全 域	
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫50日前まで								
ソルガム		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫30日前まで								
麦類 (小麦を除く)		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫90日前まで	100~ 200ml /10a				1回	雑草 茎葉 散布		
小麦		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫45日前まで								
はとむぎ		生育期 (雑草の3~6葉期) 但し収穫45日前まで	150ml /10a				2回 以内	雑草 茎葉 散布		
べにばないんげん		生育期 (雑草の生育初期~ 6葉期) 但し収穫45日前まで	100~ 200ml /10a				1回			
せり		親株養成期 植付45~60日後まで	200ml /10a				100ℓ /10a	雑草 茎葉 散布		

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびベンタゾンを含む農薬の総使用回数の制限を示す。