

殺虫剤

フリアス®

フロアブル

®=BASF社の登録商標

有効成分
フィプロニル(PRTR・1種) …………… 5.0%

登録番号：第21719号
性 状：淡黄色水和性
粘稠懸濁液体
毒 性：医薬用外劇物
有効年限：3年
包 装：250ml×20本



■適用害虫と使用方法

(2017年11月30日現在)

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フィプロニルを含む農薬の総使用回数 |
|------|---|-------|--|----------|---------|------|---|
| なたね | コナガ | 3000倍 | 100~300ℓ /10a | 収穫14日前まで | | 散布 | 1回 |
| キャベツ | ハイマダラノメイガ コナガ | 100倍 | セル成型育苗 トレイ1箱 またはペーパー ポット1冊 (30×60cm、 使用土壌約 3~4ℓ) 当り0.5ℓ | 定植前まで | 1回 | 灌注 | 3回以内 (定植前の 処理は 1回以内、 定植後の 散布は 2回以内) |
| | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ タマナギンウワバ オオタバコガ キスジノミハムシ | 2000倍 | 100~300ℓ /10a | 収穫14日前まで | 2回以内 | 散布 | |

| 作物名 | 適用害虫名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | フィプロニルを含む農薬の総使用回数 |
|---------------|---|-------|--|--------------|---------|----------|---|
| はくさい | ハイマダラノメイガ コナガ | 100倍 | セル成型育苗 トレイ1箱 またはペーパー ポット1冊 (30×60cm、 使用土壌約 3~4ℓ) 当り0.5ℓ | 定植前まで | 1回 | 灌注 | 3回以内 (定植前の 処理は 1回以内、 定植後の 散布は 2回以内) |
| | コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ネギアザミウマ キスジノミハムシ タマナギンウワバ オオタバコガ | | | 収穫21日前 まで | | | |
| チンゲンサイ | コナガ | 2000倍 | 100~300ℓ /10a | 収穫30日前 まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| カリフラワー | | | | 収穫14日前 まで | | | |
| ブロッコリー | コナガ ハイマダラノメイガ | | | 収穫30日前 まで | | | |
| 未成熟 とうもろこし | アワノメイガ オオタバコガ | | | 収穫14日前 まで | | | |
| てんさい | テンサイトビハムシ | 50倍 | ペーパーポット 1冊当り1ℓ (3ℓ/m ²) | 定植前まで | 1回 | 苗床 灌注 | 1回 |
| ストック | コナガ | 2000倍 | 100~300ℓ /10a | 発生初期 | 5回以内 | 散布 | 5回以内 |
| きく カーネーション | アザミウマ類 オオタバコガ | | | | | | |
| ばら | ミカンキイロアザミウマ チュウレンジハバチ | | | | | | |