

ほうれんそう版

農林水産省登録
第19184号

BASF
We create chemistry

次世代防除もやっぱりコテツ!

ほうれんそうケナガコナダニに 優れた効果!



被害株



ほうれんそうケナガコナダニ

■適用害虫と使用方法(抜粋)


作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	ほうれんそうケナガコナダニ	4000~6000倍	100~300ℓ/10a	2葉期まで 但し 収穫14日前まで	1回	散布	1回

詳しくは製品ラベルをご確認ください。

使用時期: 2葉期まで 但し 収穫14日前まで

散布数日後に下記のような薬害が発生しますが、その後展開する葉には薬害症状はでません。また、今までの知見では作物が枯れるようなことはありませんでした。

本葉2枚展開
(2葉期)



子葉

2葉期のほうれんそう

必ず使用時期を守ってください。

薬害症状

4000倍 処理



子葉に発生した薬害



本葉に発生した薬害

【使用上の注意事項】

- ほうれんそうに使用する場合、葉に白化などの薬害を生じるおそれがあるので、必ず使用時期を守って使用してください。
- ほうれんそうに使用する場合、展着剤および他の殺菌、殺虫剤、液肥等との混用はさけてください。

難防除害虫に効く

コテツ[®]フロアブル

®=BASF社の登録商標

有効成分: クロルフェナピル...10.0%

毒性: 医薬用外劇物

