

だいで畑に **ペンディメタリン** **リニユロン** **ジメテナミドP**  
鉄壁の3ディフェンス

だいで・えだまめ用土壌処理除草剤

**プロールプラス<sup>®</sup>** 乳剤

®=BASF社の登録商標



**□・BASF**

We create chemistry

## 特長

3種類の除草成分により、広範囲の雑草(イネ科・広葉雑草全般)に優れた効果を発揮します。

1

幅広い雑草に卓効

**ペンディメタリン**

実績の広葉剤

**リニュロン**

イネ科雑草に長期残効

**ジメテナミドP**

2

約1~2ヶ月の間、雑草をしっかり抑制します。

3

アレチウリやマルバルコウなどの  
問題雑草に対する抑草効果があります。



マルバルコウ



アレチウリ

## 適用雑草と使用方法

| 作物名         | 適用雑草名 | 使用時期              | 適用土壌           | 使用量                   |                     | 本剤の使用回数 | 使用方法   | 適用地帯 |
|-------------|-------|-------------------|----------------|-----------------------|---------------------|---------|--------|------|
|             |       |                   |                | 薬量                    | 希釈水量                |         |        |      |
| だいず<br>えだまめ | 一年生雑草 | は種後出芽前<br>(雑草発生前) | 全土壌<br>(砂土を除く) | 400~<br>600ml<br>/10a | 70~<br>150ℓ<br>/10a | 1回      | 全面土壌散布 | 全域   |

| ジメテナミドおよびジメテナミドPを含む<br>農薬の総使用回数 | ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数 | リニュロンを含む農薬の総使用回数                     |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
| 1回                              | 1回                  | 2回以内(全面土壌散布は1回以内、<br>雑草茎葉兼土壌散布は1回以内) |

## 殺草スペクトラム(植調委託試験結果から)

◎: 極大 ○: 大 △: 中 ×: なし

|          |   |            |   |       |   |             |   |
|----------|---|------------|---|-------|---|-------------|---|
| イヌビエ     | ◎ | タカサブロウ     | ◎ | イヌビユ  | ◎ | オオツメクサ      | ◎ |
| メヒシバ     | ◎ | アメリカセンダングサ | ◎ | タデ類   | ◎ | カヤツリグサ      | ◎ |
| オヒシバ     | ◎ | ハキダメギク     | ◎ | タニソバ  | ◎ | ツククサ        | ○ |
| エノコログサ   | ◎ | スベリヒユ      | ◎ | ナズナ   | ◎ | ヒロハフウリンホオズキ | ◎ |
| スズメノカタビラ | ◎ | シロザ        | ◎ | ハコベ   | ◎ | エノキグサ       | ○ |
| アゼガヤ     | ◎ | ホンアオゲイトウ   | ◎ | ザクロソウ | ◎ |             |   |



イヌビエ



メヒシバ



シロザ



イヌビユ



カヤツリグサ

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は農場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2019年4月の知見に基づいて作成されています。