

殺虫剤

カスケード[®]乳剤

®=BASF社の登録商標

有効成分
フルフェノクスロン 10.0%
補助成分
メチルナフタレン(PRTR・1種) 15.9%

登録番号：第18500号
性 状：黄色澄明可乳化
油状液体
毒 性：普通物*
危 険 物：三石・非水溶性・Ⅲ
有効年限：5年
包 装：250ml×20本
500ml×20本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用害虫と使用方法

(2019年8月28日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000～ 4000倍					
	ハマキムシ類	2000～ 6000倍					
	ヨモギエダシャク	4000倍					
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000倍		収穫21日 前まで			
	ハダニ類	4000倍					
もも	ハマキムシ類	2000～ 4000倍		収穫14日 前まで			
	モモハモグリガ	4000倍					
ネクタリン	ハダニ類	2000倍	収穫7日 前まで				
	ハマキムシ類	4000倍					
	モモハモグリガ	2000～ 4000倍					
小粒核果類	ケムシ類	4000倍					
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	ヨモギエダシャク	4000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000～4000倍							
	ミカンハダニ	1000～2000倍							
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類	4000倍		収穫14日前まで					
	カキクダアザミウマ	2000～4000倍							
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍	収穫3日前まで						
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000倍	収穫30日前まで						
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アザミウマ類 オオタバコガ	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
	はくさい							コナガ アオムシ ヨトウムシ	
だいこん	コナガ アオムシ	4000倍		収穫14日前まで				1回	1回
はつかだいこん	ハイマダラノメイガ			2000～4000倍				収穫7日前まで	3回以内
わさびだいこん	コナガ	2000～4000倍	2回以内	3回以内	3回以内				
非結球 あぶらな科 葉菜類	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000倍	収穫21日前まで	3回以内	3回以内				
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内				
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類	4000倍	収穫3日前まで	3回以内	3回以内				
レタス 非結球レタス くきちしゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ		2000～4000倍	収穫前日まで	4回以内	4回以内			
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類								
	マメハモグリバエ オオタバコガ								
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数	
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～ 4000倍						
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍						
なす	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍			4回以内		4回以内	4回以内
	マメハモグリバエ ハダニ類	2000倍						
	カメムシ類	4000倍						
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000倍			3回以内		3回以内	3回以内
ししとう	オオタバコガ	2000倍						
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000倍						
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く)	ハスモンヨトウ	4000倍			収穫7日 前まで		2回以内	2回以内
パセリ							1回	1回
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ	4000倍			収穫14日 前まで		3回以内	3回以内
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000倍			収穫7日 前まで 但し、伏せ 込み栽培 は伏せ込 み前まで		2回以内	2回以内
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000倍			収穫14日 前まで		3回以内	3回以内
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類	4000倍						
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍	収穫前日 まで	4回以内	4回以内			
	ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000倍						
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000～ 4000倍	収穫7日 前まで	3回以内	3回以内			
	シロイチモジヨトウ	4000倍						
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍	収穫7日 前まで	3回以内	3回以内			
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000倍						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
かぼちゃ	トマトハモグリバエ			収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
うり類 (漬物用) (しろうり、とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	1回		1回
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで			
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000～4000倍		収穫前日まで	4回以内		4回以内
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000倍					
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ	2000～4000倍					2回以内
	オオタバコガ	4000倍					
てんさい	ヨトウムシ	2000～4000倍		収穫7日前まで	4回以内		4回以内
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000倍					
	ヨトウムシ	1000倍	25ℓ/10a				
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000倍	100～500ℓ/10a	収穫前日まで			2回以内
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～4000倍		収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ハウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内	3回以内	
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ						
	マメハモグリバエ	2000倍					
さやいんげん	ハスモンヨトウ	4000倍			収穫前日まで	2回以内	2回以内
	マメハモグリバエ	2000倍					
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000倍					
未成熟ささげ	ハスモンヨトウ						
未成熟ふじまめ		3000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ マメシンクイガ カメムシ類 ハダニ類			収穫7日 前まで			
あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000倍					
みょうが (茎葉)	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合にあ っては開 花期終了まで	3回以内	散布	3回以内
みょうが (花穂)				収穫前日 まで		散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィル ム被覆に より散布 液が直接 花穂に飛 散しない 状態で使 用する	
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く)							
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000倍		収穫3日 前まで	2回以内	散布	2回以内
にんじん	ヨトウムシ						
タラゴン							
つるむらさき	ハスモンヨトウ			収穫前日 まで			
ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ				収穫7日 前まで			
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ			収穫3日 前まで			
食用トレニア	ハスモンヨトウ						
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ	2000倍		収穫3日 前まで			

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍		収穫7日 前まで			
食用さくら (葉)	アザミウマ類	4000倍	200～ 700ℓ /10a				
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ	4000倍	200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで			
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	—	3回以内	散布	3回以内
ばら	ハダニ類	1000倍					
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍					
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	4000倍					
スターチス	ハスモンヨトウ	2000倍					
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ						
宿根アスター	シロイチモジヨトウ						
はぼたん	コナガ						
けいとう	シロオビノメイガ						
カーネーション ほおずき	タバコガ						
りんどう	リンドウホソハマキ	4000倍	100～ 700ℓ /10a				