

殺菌剤

デラン[®]フロアブル

®=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **M9**

有効成分

ジチアノン(PRTR・1種) 42.0%

登録番号：第21816号

性 状：褐色水和性

粘稠懸濁液体

毒 性：医薬用外劇物

有効年限：3年

包 装：500ml×20本



■適用病害と使用方法

(2019年10月31日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジチアノンを含む農薬の総使用回数				
かんきつ	黒点病	1000~1500倍	200~700ℓ /10a	収穫30日前まで	3回以内	散布	3回以内				
	そうか病 炭疽病(さび果)	1000倍									
りんご	輪紋病	1000~2000倍		収穫60日前まで				3回以内	散布	3回以内	
	モニリア病 斑点落葉病 黒星病 炭疽病										
	黒点病 褐斑病										
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病	2000倍		収穫90日前まで				5回以内	散布	5回以内	
もも	せん孔細菌病	600~1000倍		200~700ℓ /10a				収穫7日前まで	4回以内	散布	4回以内
	灰星病 ホモブシス腐敗病	600倍									
	黒星病	600~1000倍									
	縮葉病	1000倍									
ネクタリン	せん孔細菌病	600~1000倍	200~700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内				
	灰星病 ホモブシス腐敗病	600倍									
	黒星病	600~1000倍									
	縮葉病	1000倍									

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジチアノンを含む農薬の総使用回数
うめ	黒星病	1500～2000倍	200～700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内	散布	2回以内
	すす斑病	2000倍					
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病 赤星病 疫病 炭疽病 心腐れ症 (胴枯病菌) 黒斑細菌病	1000倍		収穫60日前まで	4回以内		5回以内
	ぶどう			枝膨病 べと病 黒とう病 晩腐病	落弁期まで 但し、収穫75日前まで		2回以内
黒とう病 晩腐病 つる割病		200倍		休眠期	1回		
いちじく	そうか病	1000倍		収穫75日前まで	3回以内		3回以内
おうとう	褐色せん孔病			収穫終了後～ 落葉期まで			
いちご	炭疽病			100～300ℓ /10a	育苗期		2回以内
せんりょう		200～700ℓ /10a	発病初期	3回以内	3回以内		