

除草剤

ゴゴザン[®] 細粒剤F

®=BASF社の登録商標

除草剤分類 **K1**

有効成分

ペンディメタリン(PRTR・1種) …… 2.0%


登録番号：第16458号

性 状：黄色細粒及び微粒
180～710μm

毒 性：普通物*

有効年限：3年

包 装：3kg×8袋
10kg×2袋



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2020年2月12日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
麦類	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	砂壤土 ～埴土	5～6kg /10a	1回	全面土壌散布	全 域	1回
陸稲				4～6kg /10a				
にんじん				4～5kg /10a				
ソルガム				4～6kg /10a				
とうもろこし 飼料用 とうもろこし				5～6kg /10a				
らっかせい			5kg/10a	関東以西				
パセリ			全土壌	全 域				
さといも	植付前(雑草発生前)	砂壤土 ～埴土	4～6kg /10a	2回以内 (土寄せ後の処理は 1回以内)				
	植付後萌芽前 (雑草発生前)							
	土寄せ後(雑草発生前) 但し、収穫60日前まで							
ばれいしょ (マルチ栽培を除く)	植付後萌芽前 (雑草発生前)	砂壤土 ～埴土	4～6kg /10a	全 域 (北海道を除く)	1回			
ばれいしょ (マルチ栽培)	植付後マルチ前、但し、 萌芽前まで(雑草発生前)							

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	一年生雑草	定植前又は定植後～定植翌日(雑草発生前)	砂壤土～埴土	4～5kg/10a	1回	全面土壌散布	全 域	1回	
はくさい レタス 非結球レタス		定植前(雑草発生前)	全土壌	4～6kg/10a					
アスパラガス		萌芽前(雑草発生前)							
にんにく		植付前(マルチ前)	砂壤土～埴土	5～6kg/10a					
		植付後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで							
たまねぎ(春播栽培)		定植後(雑草発生前)但し、収穫30日前まで	全土壌	4～6kg/10a					
たまねぎ(秋播栽培)		定植後又は生育期(雑草発生前)但し、収穫30日前まで							
たまねぎ(秋播マルチ栽培)		定植前(マルチ前)	全土壌	5～6kg/10a					
ねぎ		定植後(雑草発生前)但し、定植10日後まで							
しょうが		植付後萌芽前(雑草発生前)	全土壌	5～6kg/10a					
こんにゃく		植付後又は培土後(雑草発生前)但し、植付30日後まで							
みしまさいこ		は種後～発芽期又は萌芽期(雑草発生始期まで)	壤土～埴壤土	3～5kg/10a					
桑		春期発芽前又は夏切り後(雑草発生前)	全土壌	5～6kg/10a					2回以内
チューリップ		植付後萌芽前(雑草発生前)	砂壤土～埴土	4～6kg/10a					1回
きく		定植後(雑草発生前)	全土壌						
つつじ類		生育期(雑草発生前)		全土壌					
ヤングコーン	は種後出芽前(雑草発生前)								
葉たまねぎ	定植前(マルチ前)	砂壤土～埴土	4～6kg/10a						
葉にんにく	植付前(マルチ前)								
	植付後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで	全土壌	4kg/10a						
いぐさ	畑苗床での定植後(雑草発生前)(入水15日前まで)								