

除草剤

ゴゴザン[®]乳剤

®=BASF社の登録商標

除草剤分類 **K1**

有効成分

ペンディメタリン(PRTR・1種) …… 30.0%

登録番号：第22176号

性 状：暗褐色澄明可
乳化油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：二石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年(500ml、2ℓ)
3年(5ℓ)

包 装：500ml×20本
2ℓ×10本
5ℓ×4本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2020年2月12日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
陸稲	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	全土壌	200~ 400ml /10a	70~ 150ℓ /10a	1回	全面 土壌 散布	北海道 を除く 全域	1回
麦類 (小麦を除く)				300~ 500ml /10a	70~ 100ℓ /10a				
小麦		は種後(雑草発生前) ~小麦2葉期(イネ 科雑草1葉期まで)	砂壤土 ~埴土	300ml /10a			70~ 150ℓ /10a	雑草 茎葉 散布 又は 全面 土壌 散布	
ソルガム		ソルガム3葉期 (雑草発生前~ 発生始期)		300~ 400ml /10a					
とうもろこし 飼料用 とうもろこし ヤングコーン		は種後出芽前 (雑草発生前)	全土壌	200~ 400ml /10a	100ℓ /10a		全面 土壌 散布		
かんしょ		挿苗10日後まで (雑草発生前)		畦間 土壌 散布					

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数			
				薬量	希釈水量							
さといも	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	全土壌	200～ 400mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a	1回	全面 土壌 散布	全域	2回以内 (土寄せ後の 処理は1回以内)			
		土寄せ後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで			100ℓ /10a							
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)		200～ 300mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a							
				やまのいも	200～ 400mℓ /10a					100ℓ /10a		
こんにゃく		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し植付30日後まで			200～ 300mℓ /10a					70～ 100ℓ /10a	全面 土壌 散布	北海道、 九州を 除く 全域
はくさい		定植前 (雑草発生前)		壊土～ 埴土	200～ 400mℓ /10a					70～ 150ℓ /10a		全域
キャベツ カリフラワー レタス 非結球レタス			全土壌	400mℓ /10a			100ℓ /10a					
うど								定植後萌芽前 (根株養成圃) (雑草発生前)	200～ 400mℓ /10a		70～ 100ℓ /10a	
		生育期(根株養成圃) (雑草発生前) 但し収穫60日前まで	100ℓ /10a	畦間 土壌 散布								
たまねぎ (直播栽培)		は種後～ 本葉2葉期 (雑草発生前)	200～ 400mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a	全面 土壌 散布		北海道	1回				
たまねぎ (移植栽培)		定植前 (雑草発生前)	300～ 500mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a			全面 土壌 散布		全域			
		定植後 (雑草発生前) 但し収穫30日前まで										
葉たまねぎ		定植前 (雑草発生前)	200～ 300mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a			全面 土壌 散布		全域			
らっきょう		植付後萌芽前 (雑草発生前)										
ねぎ	定植後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで	300～ 500mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a	全面 土壌 散布		全域						
にら	収穫30日前まで (雑草発生前)		100ℓ /10a				畦間 土壌 散布					
にんにく	植付前(マルチ前)	300～ 500mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a	全面 土壌 散布		全域						
	植付後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで		70～ 100ℓ /10a				壊土～ 埴土					

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	使用量		本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量				
葉にんにく (マルチ栽培)	一年生雑草	植付前(マルチ前)	全土壌	400～ 500mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a	1回	全面 土壌 散布	1回	
葉にんにく (マルチ栽培 を除く)		植付前		300～ 400mℓ /10a	100ℓ /10a				
らっかせい		植付後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで		200～ 300mℓ /10a					
にんじん		は種後出芽前 (雑草発生前)							
アスパラガス		萌芽前 (雑草発生前)		200～ 400mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a				
しょうが		植付後萌芽前 (雑草発生前)							
ふき(春どり 露地栽培)		春期収穫直後から 萌芽前まで (雑草発生前)		400mℓ /10a					
ふき (ふきのとう)		春期ふき収穫直後 から萌芽前まで (雑草発生前)							
とりかぶと (薬用)		生育期 (雑草発生前) 但し収穫90日前まで		300～ 500mℓ /10a	100ℓ /10a				
おけら		収穫60日前まで (雑草発生前)		200～ 300mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a				
みしまさいこ ぼうふう びやくし		は種後出芽前 (雑草発生前)							
せんきゅう		萌芽後(雑草発生前) 但し収穫120日前まで		300mℓ /10a	100ℓ /10a				
とうき いんちんこう		定植後(雑草発生前) 但し収穫120日前まで							
食用ぎく		定植前(雑草発生前)		200～ 400mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a				
きく		定植後(雑草発生前)							
りんどう		萌芽前(雑草発生前)							
チューリップ		植付後萌芽前 (雑草発生前)		300～ 500mℓ /10a					
すぎ(床替床) ひのき (床替床)		床替後 (雑草発生前)		400～ 500mℓ /10a	100～ 200ℓ /10a				
桑		春期発芽前 又は夏切後 (雑草発生前)		300～ 400mℓ /10a					
						2回 以内		2回以内	