

殺菌剤

ナリア[®]WDG

[®]=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **11, 7**

有効成分

ピラクロストロビン 6.8%

ボスカリド 13.6%

登録番号：第21795号

性 状：褐色水和性細粒
及び微粒

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：250g×40袋
500g×20袋



* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用病害と使用方法

(2019年6月26日現在)

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 |
|------|---|-------|----------------------|------------|---------|------|----------------------|------------------|
| りんご | 斑点落葉病 黒星病 褐斑病 炭疽病 すす点病 すす斑病 輪紋病 黒点病 うどんこ病 腐らん病 | 2000倍 | 200～ 700ℓ /10a | 収穫前日 まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 | 3回以内 |
| なし | 黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 炭疽病 | | | | | | | |
| おうとう | 灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病 幼果菌核病 | | | | | | | |
| もも | 灰星病 ホモプス腐敗病 黒星病 果実赤点病 すすかび病 うどんこ病 炭疽病 | | | | 2回以内 | | 2回以内 | 2回以内 |

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクロストロピンを含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 | |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------|----------------------|------------------|------|
| ネクタリン | 灰星病 ホモブシス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病 | 2000倍 | 200～ 700ℓ /10a | 収穫前日 まで | 2回以内 | 散布 | 2回以内 | 2回以内 | |
| かき | 落葉病 炭疽病 うどんこ病 | 2000～ 3000倍 | | 収穫7日前 まで | 3回以内 | | 3回以内 | 3回以内 | |
| 大粒種 ぶどう | 晩腐病 | 2000倍 | | 収穫14日 前まで | | | 3回以内 | 3回以内 | |
| かんきつ | そうか病 黒点病 灰色かび病 炭疽病(さび果) | 2000～ 2500倍 | | 収穫7日前 まで | 2回以内 | | 2回以内 | 2回以内 | |
| 小粒核果類 (うめ、すも もを除く) | 黒星病 | 2000倍 | | 収穫前日 まで | | | | | |
| うめ | 黒星病 環紋葉枯病 すす斑病 | | | | | | | | |
| すもも | 黒星病 灰星病 ふくろみ病 | | | | | | | | |
| キウイ フルーツ | 灰色かび病 すす斑病 果実軟腐病 | 2000倍 | | 摘採7日前 まで | 3回以内 | | 3回以内 | 3回以内 | |
| 茶 | 炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 もち病 網もち病 褐色円星病 黒葉腐病 赤葉枯病 | 200～ 400ℓ /10a | | 200～ 700ℓ /10a | 収穫14日 前まで | | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |
| ホップ | べと病 うどんこ病 | 200～ 700ℓ /10a | | 200～ 700ℓ /10a | 収穫14日 前まで | | 3回以内 | 3回以内 | 3回以内 |