

## 殺菌剤

# ストロビー® ドライフロアブル

® = BASF社の登録商標



有効成分  
クレソキシムメチル  
(PRTR・1種) ..... 50.0%

登録番号：第22015号  
性 状：褐色水和性細粒  
及び微粒  
毒 性：普通物\*  
有効年限：5年  
包 装：500g×20袋

\* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用病害と使用方法

(2017年11月30日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クレソキシムメ チルを含む農薬 の総使用回数
かんきつ	そうか病 黒点病 灰色かび病	2000～ 3000倍	200～ 700ℓ 10a	収穫14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
	褐色腐敗病 黄斑病	2000倍					
	そばかす病	2000～ 3000倍					
りんご	炭疽病	3000倍		収穫前日 まで			
	黒点病 黒星病 うどんこ病 モニリア病						
	斑点落葉病 赤星病	1500～ 3000倍					
	輪紋病 すす点病 すす斑病 褐斑病	2000～ 3000倍					
なし	輪紋病 黒斑病 うどんこ病	3000倍					
	黒星病		3000倍				
	炭疽病	2000倍					

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数		
もも ネクタリン	黒星病 うどんこ病 灰星病 縮葉病(休眠期) 黒斑病	2000倍	200～ 700ℓ 10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内		
うめ	黒星病 すす斑病	2000～ 3000倍		収穫7日前 まで					
	うどんこ病 灰色かび病 環紋葉枯病	2000倍							
小粒核果類 (うめ、すももを除く)	環紋葉枯病								
ぶどう	黒とう病 べと病 枝膨病 晩腐病 灰色かび病 褐斑病	2000～ 3000倍		収穫14日前 まで					
	うどんこ病 さび病								
かき かき(葉)	うどんこ病 落葉病 炭疽病 灰色かび病	3000倍							
キウイフルーツ	灰色かび病	2000～ 3000倍		収穫前日 まで					
	貯蔵病害 (灰色かび病) すす斑病	2000倍							
あけび(果実)	うどんこ病	3000倍							
すもも	炭疽病 環紋葉枯病	2000倍		収穫7日前 まで					
ブルーベリー	斑点病 灰色かび病	3000倍		収穫14日前 まで				2回以内	2回以内
さんしょう(果実)	さび病	2000倍		収穫前日 まで				3回以内	3回以内
マンゴー	炭疽病			収穫21日前 まで					
バナナ	黒星病	3000倍		発病初期					
やなぎ	葉さび病								
せいようきんしばい	さび病								
ぼけ	赤星病 褐斑病								
じんちょうげ	黒点病								
ポプラ	マルゾニナ落葉病								