

総合殺菌剤

# ストロビー® ドライフロアブル

かんきつのそうか病・灰色かび病・  
黒点病・褐色腐敗病をノックアウト!

 **BASF**

We create chemistry

かんきつのそうか病・灰色かび病・黒点病・褐色腐敗病をノックアウト!

# ストロビー® ドライフロアブル

クレソキシムメチル(PRTR・1種)…50.0% 殺菌剤分類 11 毒性:普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称) 包装:500g×20袋

農林水産省登録 第22015号

## ■特長

- ①従来の殺菌剤とはまったく異なる系統のストロビルリン系殺菌剤です。
- ②他剤耐性菌に対しても有効です。
- ③そうか病・灰色かび病・黒点病に高い効力を示し、これら3病害の同時防除が可能です。

## ■適用病害の範囲および使用方法

\*本剤およびクレソキシムメチルを含む農薬の総使用回数

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10a当り使用液量	使用時期	総使用回数*	使用方法
かんきつ	そうか病 黒点病 灰色かび病 そばかす病	2,000~ 3,000	200~ 700ℓ	収穫14日 前まで	3回以内	散布
	褐色腐敗病 黄斑病	2,000				

**注意** 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用は避け、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。

## ■上手な使い方

■: 重点防除時期    ■: 防除時期

月・旬	4月			5月			6月			7月			8月			9月					
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下			
生育ステージ	発芽期			開花期			落弁期			幼果期			生理落果期			果実肥大期					
ストロビー防除適期	①			②																	
病害重点防除時期	■ そうか病						■ 灰色かび病			■ 黒点病						■ そばかす病			■ 褐色腐敗病		

### 防除適期

- ①そうか病の防除  
散布時期:4月(発芽期)  
希釈倍数:2,000~3,000倍
- ②灰色かび病を中心としたそうか病、初期の黒点病の同時防除  
散布時期:5月中~下旬  
(開花期~落弁期)  
希釈倍数:2,000~3,000倍

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。  
●使用後の空袋は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

本資料は2020年4月現在の登録内容に基づいています。

## BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階  
☎0120-014-660 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

5201011 5  
202004