

7作物に  
適用拡大!

# カスタード<sup>®</sup>乳剤

®=BASF社の登録商標



脱皮阻害型殺虫剤 いろいろな害虫に効く!いろいろな作物に使える!

## 特長

1. チョウ目、アザミウマ目、ダニ目、カメムシ目、ハエ目など幅広い害虫に効果!
2. 適用作物が広い。100種類以上の作物に使用可能!
3. 独特な作用機作と優れた残効性
4. 天敵類に影響が少ない
5. EU/台湾向けのお茶・りんごにも使用可能!



## ■主な適用害虫



## ■適用病害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数		
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000	200~ 700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内		
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000~ 4000					
	ハマキムシ類	2000~ 6000					
	ヨモギエダシヤク	4000					
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000				収穫21日前まで	2回以内
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000					
もも	ハダニ類	2000				収穫14日前まで	2回以内
	モモハモグリガ	2000~ 4000					
ネクタリン	ハダニ類	2000				収穫7日前まで	2回以内
	ハマキムシ類	4000					
小粒核果類	モモハモグリガ	2000~ 4000	収穫3日前まで	2回以内			
おうとう	ケムシ類	4000					
かんきつ	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000	収穫14日前まで	2回以内			
	ヨモギエダシヤク ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000~ 4000					
	ミカンハダニ	1000~ 2000					
	カキノヘタムシガ ケムシ類	4000					
かき	カキクダアザミウマ	2000~ 4000	収穫3日前まで	2回以内			
	カキクダアザミウマ	2000~ 4000					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000	収穫30日前まで	2回以内			
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000					
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ アザミウマ類 オオタバコガ	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内		
	はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ				収穫14日前まで	3回以内
	だいこん	コナガ アオムシ					
	はつかだいこん	ハイマダラノメイガ				収穫7日前まで	3回以内
	わさびだいこん	コナガ					

## ■使用方法：散布

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
非結球あぶらな 科葉菜類	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000	100~ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内
	なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類		2000~ 4000	収穫21日前まで
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類	4000	100~ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内
レタス 非結球レタス くきちしゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ	4000		収穫3日前まで	3回以内
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~ 4000			
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000			
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~ 4000			
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000			
なす	ミナミキイロアザミウマ	2000~ 4000	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内
	マメハモグリバエ ハダニ類 カメムシ類	4000			
	オオタバコガ	2000			
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	2000	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内
ししとう	オオタバコガ	2000			
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	2000	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く)	ハスモンヨトウ	4000			
パセリ	ハスモンヨトウ	4000	100~ 300ℓ /10a	収穫前日まで	1回
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ	4000			
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000	100~ 300ℓ /10a	収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培 は伏せ込み前まで	2回以内

■適用病害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
ねぎ	シロイチモジトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類			収穫前日まで	4回以内
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000~4000 2000		収穫前日まで	
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ シロイチモジトウ	2000~4000 4000		収穫7日前まで	3回以内
メロン	ミナミキイロアザミウマ タバココナジラミ類 (シルバー・フコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000~4000		収穫前日まで	1回
かぼちゃ	トマトハモグリバエ	2000		収穫3日前まで	
うり類(漬物用) (しろうり、とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで	3回以内
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで	4回以内
とうがん	ミナミキイロアザミウマ	2000~4000		収穫前日まで	
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000~4000		収穫前日まで	2回以内
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000	収穫前日まで		
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ	2000~4000 4000	収穫前日まで	4回以内	
てんさい	ヨトウムシ シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ ヨトウムシ	2000~4000 4000 1000	25ℓ/10a		収穫7日前まで
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000	100~500ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000	収穫7日前まで		
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	2000		収穫前日まで	2回以内
さやいんげん	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000 2000		収穫前日まで	
さやえんどう えんどう	シロイチモジトウ ハスモンヨトウ	4000		収穫前日まで	
未成熟さざげ 未成熟ふじまめ	ハスモンヨトウ	3000		収穫前日まで	
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000		収穫前日まで	

■使用方法：散布

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数	
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ マメシクイガ カメムシ類 ハダニ類	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	
	カメムシ類*1	32	0.8ℓ/10a			
あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000	100~300ℓ/10a	みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫し ない場合にあっては 開花期終了まで	3回以内	
みょうが (茎葉)	ハスモンヨトウ	2000				収穫前日まで
みょうが (花穂)*2	ハスモンヨトウ	4000		100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く)	ハスモンヨトウ					
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000		2000	収穫前日まで	2回以内
にんじん	ヨトウムシ					
タラゴン	ハスモンヨトウ	4000		2000	収穫7日前まで	2回以内
つるむらさき						
ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ	ハスモンヨトウ	4000		2000	収穫3日前まで	2回以内
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ					
食用トレニア	ハスモンヨトウ	4000	2000	収穫3日前まで	2回以内	
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ					
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	4000	200~700ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	
食用きく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000				
食用さくら(葉)	アザミウマ類	4000	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	
茶	チャノコカモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメコバイ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ	4000	200~400ℓ/10a	摘採7日前まで		
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内	
ばら	ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	1000 2000				
宿根かすみそう	シロイチモジトウ	4000	100~300ℓ/10a	—	3回以内	
スターチス	ハスモンヨトウ	2000				
ソリダゴ	シロイチモジトウ ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内	
宿根アスター	シロイチモジトウ					
はばたん	コナガ	2000	100~300ℓ/10a	—	3回以内	
けいとう	シロオビノメイガ					
カーネーション ほおすき	タバコガ	4000	100~700ℓ/10a	—	3回以内	
りんどう	リンドウホソハマキ	4000	100~700ℓ/10a	—	3回以内	

\*1 だいず・カメムシ類の使用方法：無人航空機による散布  
\*2 みょうが(花穂)の使用方法：散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する

このチラシの記載内容は2019年9月現在のものです。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は重場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記録しましょう。

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階  
☎0120-014-660 <https://agriculture.basf.com/jp>