

殺菌剤

ザンプロDM[®]フロアブル

[®]=BASF社の登録商標



有効成分

アメトクトラジン 27.0%
ジメトモルフ 20.3%

登録番号：第23455号

性 状：類白色水和性
粘稠懸濁液体

毒 性：普通物*

有効年限：3年

包 装：1ℓ×12本
250ml×20本

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用病害と使用方法

(2020年6月30日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アメトクトラジンを含む農薬の総使用回数	ジメトモルフを含む農薬の総使用回数
小粒種ぶどう	べと病	2000~3000倍	200~700ℓ /10a	収穫45日前まで	2回以内	散布		2回以内
大粒種ぶどう			収穫30日前まで					
ばれいしょ	疫病	1000~1500倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
		250倍	25ℓ /10a			無人航空機による散布		
		32倍	3.2ℓ /10a					
トマト ミニトマト	疫病	1500倍	100~300ℓ /10a		3回以内	散布	3回以内	
きゅうり	べと病	1500~2000倍						
たまねぎ	べと病	24倍	1.6ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	無人航空機による散布		
	白色疫病					散布		
ねぎ	べと病	1500~2000倍	100~300ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布		
レタス はくさい				収穫3日前まで				

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アムトクトラジンを含む農薬の総使用回数	ジメトモルフを含む農薬の総使用回数
だいず	べと病	1500～2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
	莖疫病	1000～1500倍						
あずき		1000倍						