

殺菌剤

カンタス[®]ドライフロアブル

®=BASF社の登録商標



殺菌剤分類 **7**

有効成分
ボスカリド 50.0%

登録番号：第21468号
性 状：褐色水和性微粒
毒 性：普通物*
有効年限：5年
包 装：(100g×10袋)×6箱
667g×20袋
1kg×10袋

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用病害と使用方法

(2020年7月22日現在)

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 |
|--------------|-----------------------|----------------|----------------------|----------|---------|------|------------------|
| かんきつ | 灰色かび病 | 1500倍 | 200~ 700ℓ /10a | 収穫14日前まで | 3回以内 | 散布 | 3回以内 |
| 大粒種ぶどう | 灰色かび病 すす点病 | 1000~ 1500倍 | | 収穫7日前まで | | | |
| 小麦 | 眼紋病 | 1500倍 | 60~150ℓ /10a | 収穫45日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| いちご | 灰色かび病 | 1000~ 1500倍 | 100~ 300ℓ /10a | 収穫前日まで | 3回以内 | | 3回以内 |
| トマト ミニトマト | 灰色かび病 菌核病 葉かび病 | | | | | | |
| なす | 灰色かび病 菌核病 すすかび病 | | | | | | |
| きゅうり | 灰色かび病 菌核病 褐斑病 | | | | | | |
| メロン すいか | 菌核病 | 1000~ 1500倍 | | 収穫14日前まで | 2回以内 | | 2回以内 |
| にんじん | 黒葉枯病 斑点病 | | | | | | |
| レタス | 灰色かび病 菌核病 | | | 収穫14日前まで | | | |
| 非結球レタス | | | | 収穫7日前まで | | | |
| くきちしゃ | | | 収穫14日前まで | | | | |
| | | | | 収穫7日前まで | | | |

| 作物名 | 適用病害名 | 希釈倍数 | 使用液量 | 使用時期 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 | |
|---|----------------|----------------|----------------------|----------|---------|------|------------------|---|
| エンダイブ | 菌核病 | 1500倍 | 100～ 300ℓ /10a | 収穫7日前まで | 1回 | 散布 | 1回 | |
| トレビス | | | | | 2回以内 | | 2回以内 | |
| キャベツ | 1回 | | | | | | | 1回 |
| なばな | 1回 | | | | 1回 | | | |
| たまねぎ | 灰色かび病 灰色腐敗病 | 1000～ 1500倍 | | 収穫前日まで | 3回以内 | | 散布 | 4回以内 (定植前は 1回以内、 定植後は 3回以内) |
| | 小菌核病 | | | | | | | |
| 豆類 (種実、但し、 らっかせい、 あずき、いんげ んまめを除く) | 菌核病 | 1500倍 | | 収穫7日前まで | 3回以内 | | | 3回以内 |
| あずき | 灰色かび病 菌核病 | 1000～ 1500倍 | | | | | | |
| | さび病 | 1500倍 | | | | | | |
| いんげんまめ | 灰色かび病 | 1000～ 1500倍 | | 収穫21日前まで | 2回以内 | | | 2回以内 |
| さやいんげん | 菌核病 | 1500倍 | | 収穫前日まで | 3回以内 | | | 3回以内 |
| 未成熟そらまめ | 赤色斑点病 さび病 | 1000倍 | | | 2回以内 | | | 2回以内 |
| さやえんどう 実えんどう | 灰色かび病 | 1500倍 | | 収穫7日前まで | 3回以内 | | | 3回以内 |
| ブロッコリー | 菌核病 | | | | | | | |
| らっきょう | 灰色かび病 | 1000～ 1500倍 | | 収穫前日まで | 3回以内 | | | 3回以内 |
| ピーマン | 灰色かび病 | | | | | | | |
| とうがらし類 | 黒枯病 | 1000倍 | 収穫7日前まで | 2回以内 | 2回以内 | | | |
| 食用ぎく | 灰色かび病 | | | | | | | |
| ブントレッタ | 灰色かび病 | 1500倍 | 収穫3日前まで | | | | | |