

## 除草剤

# フィールドスター®P乳剤

®=BASF社の登録商標

除草剤分類 **15**

有効成分

ジメテナミドP ..... 64.0%

登録番号：第22777号

性 状：暗褐色可乳化  
油状液体

毒 性：普通物\*

危 険 物：三石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年

包 装：500ml×20本  
2ℓ×10本



\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用雑草と使用方法

(2020年8月12日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用 方法	ジメテナミドおよび ジメテナミドPを含む 農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
キャベツ	一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を除く)	定植後 (雑草発生前) 但し定植後 10日まで	50~ 75ml /10a	100ℓ /10a	1回	全面 土壌 散布	1回
ブロッコリー		定植後 (雑草発生前) 但し収穫 30日前まで					
たまねぎ		定植後 (雑草発生前) 但し定植後 30日まで					
えだまめ だいず		は種後出芽前 (雑草発生前)					
とうもろこし 飼料用 とうもろこし	一年生 イネ科雑草	とうもろこし 出芽直前~ 2葉期 (イネ科雑草 2葉期まで)	75~ 120ml /10a	100ℓ /10a			
ばれいしょ	一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を除く)	植付後萌芽前 (雑草発生前)		70~ 150ℓ /10a			

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ジメテナミドおよびジメテナミドPを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
てんさい (移植栽培)	一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を除く)	定植後または 中耕後 雑草発生前 但し収穫 45日前まで	75～ 120mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a	2回 以内	全面 土壌 散布	2回以内
てんさい (直播栽培)	一年生 イネ科雑草	出芽揃期 (雑草発生前)	75mℓ /10a	100ℓ /10a			