

## 殺虫剤

# コテツ<sup>®</sup>フロアブル

殺虫剤分類 13

有効成分

クロルフェナピル ..... 10.0%

登録番号：第19184号

性 状：類白色水和性  
粘稠懸濁液体

毒 性：医薬用外劇物

有効年限：5年

包 装：(250ml×20本)×2箱  
500ml×20本



## ■適用害虫と使用方法

(2020年8月26日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	クロルフェナピルを含む農薬の 総使用回数
りんご	キンモンホソガ ナミハダニ ハマキムシ類 ミノガ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
	ヨモギエダシャク リンゴサビダニ	2000～ 4000倍					
もも	ミカンキイロアザミウマ	2000倍		収穫7日 前まで			
	モモハモグリガ カンザワハダニ ナミハダニ モモサビダニ ウメシロカイガラムシ						
ネクタリン	ミカンキイロアザミウマ	2000～ 4000倍		収穫60日 前まで			
	ナミハダニ カンザワハダニ チャノキイロアザミウマ オウトウショウジョウバエ ウメシロカイガラムシ	2000倍					
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ミカンキイロアザミウマ ブドウサビダニ	2000～ 4000倍	収穫60日 前まで				
	ナミハダニ カンザワハダニ ハスモンヨトウ トビイロトラガ モンキクロノメイガ コガネムシ類 ミノガ類 ブドウハモグリダニ	2000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数							
かき	ナミハダニ カンザワハダニ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内							
	カキノヘタムシガ イラガ類 アザミウマ類 カキサビダニ	2000～ 4000倍												
なし	ナミハダニ カンザワハダニ ニセナシサビダニ	2000～ 3000倍		2000倍	収穫前日 まで			3回以内	3回以内					
	ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ	2000倍												
かんきつ	ヨモギエダシャク ハスモンヨトウ リュウキュウミカンサビダニ カネタタキ スグリゾウムシ	2000～ 4000倍		2000～ 6000倍				収穫前日 まで		2回以内	2回以内			
	アザミウマ類 (ネギアザミウマを除く) チャノホコリダニ ミカンサビダニ	2000～ 6000倍												
いちじく	ヒラズハナアザミウマ カンザワハダニ	2000倍		100～ 300ℓ /10a								収穫14日 前まで	3回以内	3回以内
小粒核果類 (すももを除く)	オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ													
すもも	オウトウハダニ ウメシロカイガラムシ イラガ類													
キウイフルーツ	キウイヒメヨコバイ コガネムシ類													
マンゴー	チャノキイロアザミウマ													
ゴレンシ	カンザワハダニ													
ブルーベリー	イラガ類 オウトウショウジョウバエ													
あずき	ハダニ類 ノメイガ類		2回以内		2回以内	2回以内	2回以内							
豆類(未成熟、 但し、さやいんげ ん、さやえんどう、 実えんどうを除く)	ハダニ類													
さやいんげん	ハダニ類 アズキノメイガ		2回以内		2回以内	2回以内	2回以内							
実えんどう さやえんどう	ハダニ類 ハスモンヨトウ													
きゅうり	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ハダニ類 ウリノメイガ ウリハムシ	3回以内	3回以内											

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェニルを含む農薬の総使用回数
うり類 (漬物用)	ミナミキイロアザミウマ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
すいか	ミナミキイロアザミウマ	4000倍					
	ハダニ類 オオタバコガ ウリノメイガ						
にがうり かぼちゃ (日本かぼちゃ)	ミナミキイロアザミウマ						
トマト ミニトマト	オオタバコガ ミカンキイロアザミウマ ナミハダニ トマトサビダニ						
なす	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ チャノホコリダニ ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ヨトウムシ テントウムシダマシ類	2000倍					
	ピーマン とうがらし類 (ししとうを除く)	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ ハダニ類					
ししとう	ヒラズハナアザミウマ	4000倍					
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ オオタバコガ ハイマダラノメイガ						
	ブロッコリー	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ					
茎ブロッコリー	アオムシ	2000倍					
カリフラワー	コナガ						
メキャベツ 非結球メキャベツ	ハスモンヨトウ						
なばな							
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ カブラハバチ						

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数								
非結球 あぶらな科 葉菜類 (こまつな、ひろしま な、チンゲンサイ、さ んとうさいを除く)	コナガ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで	1回	散布	1回								
チンゲンサイ				収穫7日 前まで											
さんとうさい				収穫3日 前まで											
こまつな	アオムシ コナガ ハクサイダニ			ひろしまな	アオムシ コナガ	だいこん	アオムシ コナガ ダイコンサルハムシ	かぶ	コナガ ナモグリバエ ヨトウムシ	みょうが (花穂)	ハダニ類	収穫前日 まで	2回以内	散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィル ム被覆に より散布 液が直接 花穂に飛 散しない 状態で使 用する	2回以内
みょうが (茎葉)	みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合にあ っては開 花期終了まで														
いちご	ハダニ類 ハスモンヨトウ シクラメンホコリダニ ミカンキイロアザミウマ			収穫前日 まで	散布										
ねぎ	シロイチモジヨトウ ヒョウタンゾウムシ類 ネギハモグリバエ ネギコガ			収穫7日 前まで											
オクラ	ハスモンヨトウ オオタバコガ			収穫前日 まで											

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェニルを含む農薬の総使用回数
レタス	ハスモンヨトウ オオタバコガ ナモグリバエ ヨトウムシ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内
モロヘイヤ	アザミウマ類			収穫7日 前まで	1回		1回
あしたば	ウドノメイガ			収穫前日 まで	2回以内		2回以内
やまのいも	カンザワハダニ ナガイモコガ			収穫3日 前まで			
やまのいも (むかご)							
かんしょ	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内		2回以内
	ヨツモンカメノコハムシ						
はすいも (葉柄)	カンザワハダニ ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内		2回以内
さといも				収穫3日 前まで			
さといも (葉柄)							
アスパラガス	ハダニ類 オオタバコガ ハスモンヨトウ ジュウシホシクビナガハムシ ヨトウムシ	2000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
ふき	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内	
ふき (ふきのとう)				収穫90日 前まで			
てんさい	ヨトウムシ ハダニ類 カメノコハムシ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内	
セルリー	ヨトウムシ		収穫14日 前まで				
にんじん	ヨトウムシ キアゲハ ヒョウタンゾウムシ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
みつば	ハスモンヨトウ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで 但し、伏せ 込み栽培は 伏せ込み前 まで			1回
みしまさいこ				収穫21日 前まで	2回以内	2回以内	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数		
エンサイ	ハスモンヨトウ	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内	散布	2回以内		
コリアンダー(葉) やなぎたで				収穫7日前まで				1回	1回
つるむらさき				収穫14日前まで	2回以内		2回以内		
しゅんぎく				収穫前日まで					
しょうが				収穫7日前まで	3回以内		3回以内		
葉ごぼう				収穫前日まで	2回以内		2回以内		
すいぜんじな	ハダニ類 ヨトウムシ			2000倍	100～300ℓ/10a		収穫前日まで	2回以内	2回以内
よもぎ	ミナミキイロアザミウマ						収穫3日前まで	1回	1回
葉にんにく	ハダニ類						収穫14日前まで		
つわぶきとうき							収穫前日まで		
せんきゅう							収穫90日前まで	3回以内	3回以内
たらのき							親株養成期 但し、 収穫90日前まで		
はまぼうふう(葉)		シクラメンホコリダニ	根株養成期 但し、 収穫75日前まで			2回以内	2回以内		
うど			2葉期まで 但し、 収穫14日前まで			1回	1回		
ほうれんそう	ハウレンソウケナガコナダニ	4000～6000倍	200～700ℓ/10a			収穫7日前まで	2回以内	2回以内	
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	4000倍				収穫前日まで			
とうもろこし ヤングコーン	ハダニ類 オオタバコガ	2000倍				100～300ℓ/10a	収穫14日前まで	2回以内	2回以内
食用プリムラ	ハスモンヨトウ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ								

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
食用金魚草 食用なでしこ 食用エキザカム 食用せんいちこう 食用トレニア 食用パンジー	ミカンキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
食用ミニバラ				収穫3日 前まで			
茶	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキイロアザミウマ カンザワハダニ チャノナガサビダニ チャノホコリダニ シャクトリムシ類 チャノコカクモンハマキ マダラカサハラハムシ チャトゲコナジラミ		200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで			
食用ぎく	ミカンキイロアザミウマ ミナミキイロアザミウマ ヨトウムシ類 ハダニ類		100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで			
きく(葉)	オオタバコガ		100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで			
きく	アワダチソウグンバイ						
ストック	コナガ アオムシ ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		150～ 300ℓ /10a	発生初期			
花き類・ 観葉植物 (きく、ストック を除く)	ヨトウムシ類 ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		150～ 300ℓ /10a	発生初期			
しきみ	クスアナアキゾウムシ		200～ 700ℓ /10a				
アザレア	チャノホコリダニ	100～ 300ℓ /10a					
なんてん(葉)	アザミウマ類	100～ 300ℓ /10a	収穫14日 前まで				

作物名	適用場所	適用害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
みかん	温室、ガラス室等密閉 できる場所	ミカンキイロアザミウマ	300mℓ /10a	10ℓ/ 10a	収穫前日 まで	2回以内	常温煙霧	2回以内
ぶどう		チャノキイロアザミウマ	150mℓ /10a	6ℓ/ 10a	収穫14日 前まで			