

除草剤

パワーガイザー[®]液剤

®=BASF社の登録商標



除草剤分類 B

有効成分

イマザモックス アンモニウム塩 …… 0.85%
 水、界面活性剤等 …… 99.15%
 (ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル)
 (PRTR・1種) …… 5.0%)

登録番号：第20023号

性 状：淡黄色澄明
 水溶性液体

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：500ml×20本
 3ℓ×6本

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2020年8月26日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマザモックスアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数				
			薬量	希釈水量							
あずき	一年生広葉雑草	出芽直前～出芽前期(雑草発生始期～発生揃期)	200～300ml/10a	100ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	2回以内(畦間処理は1回以内)				
		生育期(雑草発生揃期～2葉期)但し、収穫30日前まで				畦間雑草茎葉散布					
いんげんまめ		出芽直前～出芽期(雑草発生始期～発生揃期)				200～300ml/10a		100ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	2回以内(畦間処理は1回以内)
		生育期(雑草発生揃期～2葉期)但し、収穫30日前まで								畦間雑草茎葉散布	
だいず	一年生雑草	出芽直前～3葉期まで(雑草発生始期～2葉期)	200～300ml/10a	100ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	2回以内(畦間処理は1回以内)				
		生育期(雑草発生揃期～2葉期)但し、収穫30日前まで				畦間雑草茎葉散布					
えだまめ	一年生広葉雑草	出芽直前～出芽前期(雑草発生始期～発生揃期)	200～300ml/10a	100ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布又は全面土壌散布	1回				

作物名	適用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	イマザモックスアン モニウム塩を含む 農薬の総使用回数			
			薬量	希釈水量						
さやいんげん	一年生 広葉 雑草	出芽直前～出芽期 (雑草発生始期～ 発生揃期)	200～ 300mℓ /10a	100ℓ /10a	1回	雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	1回			
おうぎ		出芽揃期(雑草発生 始期～発生揃期)					100ℓ /10a	1回	雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	2回以内 (畦間処理は 1回以内)
		生育期(雑草発生 揃期～2葉期) 但し、収穫60日前まで								
甘草		出芽前 (雑草発生始期)	300mℓ /10a		1年間に 1回	雑草茎葉 散布又は 全面土壌 散布	6回以内 (1年間に 2回以内 (畦間処理は 1回以内))			
		萌芽前～萌芽揃期 (雑草発生始期～ 発生揃期)								
		生育期(雑草発生 揃期～2葉期) 但し、収穫60日前まで								