


大豆・えだまめ・小豆用除草剤


パワーガイザー[®]液剤

**パワーガイザー[®]液剤は、微量でイネ科作物を含む
周辺作物に影響を与える可能性があります。
散布時にはドリフトに十分ご注意ください。**

▼散布する際は、ドリフト軽減ノズル
をご使用ください。



▼風向きに注意し、風の強い時は散布
しないでください。



- ▶ ご使用ノズルの適正圧力値内で散布してください。
- ▶ 対象作物とノズルの間隔を適正に保つようにして散布してください。

■ 散布時期(雑草茎葉散布又は全面土壌散布)

■ 大豆



■ えだまめ




■ 小豆



※注意：雑草発生前での散布は効果が劣りますのでさけてください。パワーガイザー®液剤の作用発現はやや遅効的で、薬剤の散布後約1週間程度で変色し、2~3週間で枯死します。

■ 上手な使い方(畦間雑草茎葉散布)



「パワーガイザー®液剤」をご使用の際の注意事項

- 周辺に飛散しないよう、ドリフト軽減ノズルを使用してください。また、風のある場合は散布しないでください。
- 少量の飛散で影響を与える可能性がありますので、豆以外の水稲、小麦、とうもろこし、そば、ばれいしょ等周辺作物へ薬剤が飛散しないよう、散布の際には十分注意してください。

〈適用雑草の範囲および使用方法〉

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	イマザモックスアンモニウム塩を含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
あずき	一年生広葉雑草	出芽直前～出芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)	200～300ml/10a	100ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	2回以内 (畦間処理は1回以内)
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草茎葉散布	
いんげんまめ		出芽直前～出芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)				雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	1回
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草茎葉散布	
さやいんげん	一年生雑草	出芽直前～出芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)	200～300ml/10a	100ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	2回以内 (畦間処理は1回以内)
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草茎葉散布	
だいず		出芽直前～出芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)				雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	1回
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草茎葉散布	
えだまめ	一年生広葉雑草	出芽直前～出芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)	200～300ml/10a	100ℓ/10a	1回	雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	2回以内 (畦間処理は1回以内)
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫30日前まで				畦間雑草茎葉散布	
おうぎ		出芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)				雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	6回以内 (1年間に2回以内 (畦間処理は1回以内))
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫60日前まで				畦間雑草茎葉散布	
甘草	一年生雑草	出芽前(雑草発生始期)	300ml/10a	100ℓ/10a	1年間に1回	雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	6回以内 (1年間に2回以内 (畦間処理は1回以内))
		萌芽前～萌芽揃期 (雑草発生始期～発生揃期)				畦間雑草茎葉散布	
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫60日前まで				雑草茎葉散布 又は全面土壌散布	6回以内 (1年間に2回以内 (畦間処理は1回以内))
		生育期(雑草発生揃期～2葉期) 但し、収穫60日前まで				畦間雑草茎葉散布	

△ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調整し、使い切ってください。
- 本剤は著しい低温下では凍結、分離することがあるので、散布液調製時には解凍を確認した後よく振ってから使用してください。
- 展着剤は加用しないでください。
- 有機リン系殺虫剤またはイネ科雑草処理除草剤との10日以内の近接散布は、薬害のおそれがあるのでさけてください。
- 本剤は雑草の発生始期から2葉期にかけて高い効果を示すが、雑草の生育が進むと除草効果が低下するので、使用時期を失ないように散布してください。

- 砂土では使用しないでください。
- 砕土や整地はていねいに行い、種子が露出ないように覆土はできるだけ均一、厚めに行ってください。
- 土壌が極端に乾燥している場合には、効果が劣るおそれがあるので適湿なときに、均一に散布してください。
- 処理後に降雨が予想される時には使用をさけてください。
- 初生葉期以降の散布では一時的な薬害の発生することがありますが、その後の生育には影響しません。
- 散布にあたっては、他作物に飛散しないよう十分注意して使用してください。

- 畦間散布を行う場合、薬液が作物に飛散すると黄化症状の薬害を生じるおそれがあるので、作物に飛散しないように注意してください。
- 散布器具、容器の洗浄水および残りの薬液は河川等に流さず、空容器等は圃場に放置せず適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除等関係機関の指導を受けてください。



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

本資料は2020年8月の知見に基づいて作成されています。