

殺虫剤

カスケード[®]乳剤

殺虫剤分類 **15**

有効成分

フルフェノクスロン 10.0%

補助成分

メチルナフタレン(PRTR・1種) 15.9%

®=BASF社の登録商標

登録番号：第18500号

性 状：黄色澄明可乳化
油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：三石・非水溶性・Ⅲ

有効年限：5年

包 装：250ml×20本
500ml×20本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用害虫と使用方法

(2020年12月9日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数				
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000～ 4000倍									
	ハマキムシ類	2000～ 6000倍									
	ヨモギエダシャク	4000倍									
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000倍		200～ 700ℓ /10a				収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	ハダニ類	2000倍									
もも	ハマキムシ類	4000倍		200～ 700ℓ /10a				収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内
	モモハモグリガ	2000～ 4000倍									
	ケムシ類	2000～ 4000倍									
小粒核果類	ケムシ類	2000～ 4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	ハダニ類	2000倍									
	ハマキムシ類	4000倍									
ネクタリン	ハダニ類	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫21日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	ハマキムシ類	4000倍									
	モモハモグリガ	2000～ 4000倍									
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
	ハマキムシ類	4000倍									

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数		
かんきつ	ヨモギエダシャク	4000倍	200～700ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000～4000倍							
	ミカンハダニ	1000～2000倍							
かき	カキノヘタムシガ ケムシ類 ハマキムシ類 カキクダアザミウマ	2000～4000倍		収穫14日前まで					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000倍	収穫3日前まで						
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000倍	収穫30日前まで						
キャベツ	オオタバコガ コナガ アオムシ タマナギンウワバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ アザミウマ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内		
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ								
だいこん	アオムシ コナガ	4000倍		収穫14日前まで				1回	1回
はつかだいこん	ハイマダラノメイガ			収穫7日前まで				3回以内	3回以内
わさびだいこん	コナガ		2回以内		2回以内				
非結球 あぶらな科 葉菜類 (なばな類を除く)	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000倍	収穫21日前まで	3回以内	3回以内				
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000～4000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内				
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ アザミウマ類 ヨトウムシ	4000倍	収穫3日前まで	3回以内	3回以内				
レタス 非結球レタス くきちしゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ ヨトウムシ								

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
トマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	4回以内	散布	4回以内
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～ 4000倍					
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍					
ミニトマト	ハスモンヨトウ トマトサビダニ コナジラミ類	4000倍			2回以内		
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000～ 4000倍					
	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍					
なす	マメハモグリバエ ハダニ類	2000倍			4回以内		
	ミナミキイロアザミウマ カメムシ類 オオタバコガ	2000～ 4000倍					
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000倍			3回以内		
ししとう	オオタバコガ	2000倍					
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000倍	収穫7日 前まで	2回以内	2回以内		
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、 セルリーを除く)	ハスモンヨトウ			1回	1回		
パセリ			収穫14日 前まで	3回以内	3回以内		
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ						
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000倍	収穫7日 前まで 但し、伏せ 込み栽培 は伏せ込 み前まで	2回以内	2回以内		
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000倍	収穫14日 前まで	3回以内	3回以内		
いちご	ハスモンヨトウ アザミウマ類		収穫前日 まで	4回以内	4回以内		
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍					
	ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000倍					

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	4回以内	散布	4回以内
	シロイチモジヨトウ	4000倍					
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000倍		収穫前日 まで	3回以内		3回以内
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ						
かぼちゃ	トマトハモグリバエ			収穫前日 まで			
うり類 (漬物用) (しろうり、と うがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000倍		収穫3日 前まで	1回		1回
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日 まで			
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日 前まで	3回以内		3回以内
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000～ 4000倍		収穫前日 まで	4回以内		4回以内
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000倍					
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ	2000～ 4000倍		2回以内	2回以内		
	オオタバコガ	4000倍					
てんさい	ヨトウムシ	2000～ 4000倍	25ℓ /10a	収穫7日 前まで	4回以内	4回以内	
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ	4000倍					
	ヨトウムシ	1000倍					
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	2回以内	
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～ 4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日 前まで	3回以内	3回以内	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000倍		収穫3日 前まで	3回以内	3回以内	

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数					
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内					
	マメハモグリバエ	2000倍										
さやいんげん	ハスモンヨトウ	4000倍										
	マメハモグリバエ	2000倍										
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000倍										
未成熟ささげ	ハスモンヨトウ	3000倍										
未成熟ふじまめ												
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類											
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシンクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマバエ	4000倍						0.8ℓ /10a	収穫7日 前まで	2回以内	無人航空機 による散布	2回以内
		32倍										
あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000倍										
みょうが (莖葉)				みょうが (花穂)の収 穫前日まで 但し、花穂 を収穫しな い場合にあ っては開 花期終了まで		散布						
みょうが (花穂)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布、 但し花穂 の発生期 にはマル チフィル ム被覆に より散布 液が直接 花穂に飛 散しない 状態で使 用する	3回以内					
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (バジルを除く)		4000倍		収穫3日 前まで	2回以内	散布	2回以内					
バジル	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ											

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数				
にんじん	ヨトウムシ クロバネキノコバエ類	4000倍	100～ 300ℓ /10a	収穫3日 前まで	2回以内	散布	2回以内				
タラゴン	ハスモンヨトウ			収穫前日 まで							
つるむらさき				収穫7日 前まで							
ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ				収穫3日 前まで							
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ			2000倍					収穫14日 前まで		
食用トレニア	ハスモンヨトウ										
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ			4000倍				200～ 700ℓ /10a	収穫7日 前まで		
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ										
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ										
食用なでしこ	ハスモンヨトウ	2000倍									
食用ペンタス											
食用さくら (葉)	アザミウマ類	4000倍	200～ 400ℓ /10a	摘採7日 前まで							
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ										
きく ガーベラ	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	-	3回以内		3回以内				
ばら	ハダニ類	1000倍									
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍									
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	4000倍						2000倍			
スターチス	ハスモンヨトウ										
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ										
宿根アスター	シロイチモジヨトウ										
はぼたん	コナガ										

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	フルフェノクスロンを含む農薬の総使用回数
けいとう	シロオビノメイガ	2000倍	100～ 300ℓ /10a	—	3回以内	散布	3回以内
カーネーション ほおずき	タバコガ						
りんどう	リンドウホソハマキ	4000倍	100～ 700ℓ /10a				