

除草剤

モーティブ[®] 乳剤

®=BASF社の登録商標

除草剤分類 **15,3**

有効成分

ジメテナミドP 19.7%
 ペンディメタリン(PRTR・1種) 23.1%
 有機溶剤、界面活性剤等 57.2%
 (ドデシルベンゼンスルホン酸カルシウム塩
 (PRTR・1種) 2.5%(代表値))

登録番号：第23000号

性 状：暗褐色可乳化
 油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：三石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年(500ml)

3年(5ℓ)

包 装：500ml×20本

5ℓ×4本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2020年12月9日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法
			薬量	希釈水量		
とうもろこし	一年生雑草	は種後～とうもろこし 2葉期(イネ科雑草2葉期まで)	200～ 400ml /10a	100～	1回	全面 土壌 散布
飼料用とうもろこし				150ℓ /10a		
たまねぎ		定植前(雑草発生前)		100ℓ /10a		
		定植後(雑草発生前)但し、 定植45日後まで		70～ 150ℓ /10a		
ばれいしょ		植付後萌芽前(雑草発生前)		300ml /10a		
かのこそう	定植後(雑草発生前)但し、 収穫90日前まで					

ジメテナミドおよびジメテナミドPを含む 農薬の総使用回数	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
1回	1回