

除草剤

ゴゴサジ[®]乳剤

®=BASF社の登録商標

除草剤分類 **3**

有効成分

ペンディメタリン(PRTR・1種) …… 30.0%

登録番号：第22176号

性 状：暗褐色澄明可
乳化油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：二石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年(500ml、2ℓ)
3年(5ℓ)

包 装：500ml×20本
2ℓ×10本
5ℓ×4本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2021年4月21日現在)

作物名	適 用 雑草名	使用時期	使用量		本剤の 使用 回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
陸稲	一年生雑草	は種後出芽前 (雑草発生前)	200~ 400ml /10a	70~ 150ℓ /10a	1回	全面土壌散布	1回
麦類 (小麦を除く)			300~ 500ml /10a	70~ 100ℓ /10a			
小麦		は種後(雑草発生前) ~小麦2葉期(イネ科雑草1葉期まで)	300ml /10a			70~ 150ℓ /10a	
ソルガム		ソルガム3葉期 (雑草発生前~ 発生始期)		300~ 400ml /10a			
とうもろこし 飼料用		は種後出芽前 (雑草発生前)	200~ 400ml /10a			100ℓ /10a	
とうもろこし ヤングコーン				挿苗10日後まで (雑草発生前)			
かんしょ							

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数		
			薬量	希釈水量					
さといも	一年生雑草	植付後萌芽前 (雑草発生前)	200～ 400ml /10a	70～ 100ℓ /10a	1回	全面土壌散布	2回以内 (土寄せ後の 処理は1回以内)		
		土寄せ後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで		100ℓ /10a					
ばれいしょ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	200～ 300ml /10a	70～ 100ℓ /10a		全面土壌散布	1回		
			やまのいも	200～ 400ml /10a				100ℓ /10a	
こんにゃく		植付後又は培土後 (雑草発生前) 但し植付30日後まで		200～ 300ml /10a				70～ 100ℓ /10a	
はくさい		定植前 (雑草発生前)	200～ 400ml /10a	70～ 150ℓ /10a					
キャベツ カリフラワー レタス 非結球レタス									
うど								定植後萌芽前 (根株養成圃) (雑草発生前)	400ml /10a
		生育期(根株養成圃) (雑草発生前) 但し収穫60日前まで							
たまねぎ (直播栽培)		は種後～ 本葉2葉期 (雑草発生前)	200～ 400ml /10a	70～ 100ℓ /10a				全面土壌散布	1回
たまねぎ (移植栽培)		定植前 (雑草発生前)	300～ 500ml /10a	70～ 150ℓ /10a					
		定植後 (雑草発生前) 但し収穫30日前まで							
葉たまねぎ		定植前 (雑草発生前)	植付後萌芽前 (雑草発生前)	70～ 100ℓ /10a					
らっきょう									
ねぎ	定植後 (雑草発生前) 但し定植10日後まで	200～ 300ml /10a	70～ 100ℓ /10a	畦間土壌散布					
にら	収穫30日前まで (雑草発生前)		100ℓ /10a						
にんにく	植付前(マルチ前)	300～ 500ml /10a	70～ 150ℓ /10a	全面土壌散布					
	植付後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで		70～ 100ℓ /10a						

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ペンディメタリンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
葉にんにく (マルチ栽培)	一年生雑草	植付前(マルチ前)	400～ 500mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a	1回	全面土壌散布	1回
葉にんにく (マルチ栽培 を除く)		植付前					
らっかせい		植付後 (雑草発生前) 但し収穫60日前まで	300～ 400mℓ /10a	100ℓ /10a			
にんじん		は種後出芽前 (雑草発生前)	200～ 300mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a			
アスパラガス		萌芽前 (雑草発生前)	200～ 400mℓ /10a				
しょうが		植付後萌芽前 (雑草発生前)					
ふき(春どり 露地栽培)		春期収穫直後から 萌芽前まで (雑草発生前)	400mℓ /10a				
ふき (ふきのとう)		春期ふき収穫直後 から萌芽前まで (雑草発生前)					
とりかぶと (薬用)		生育期 (雑草発生前) 但し収穫90日前まで	300～ 500mℓ /10a	100ℓ /10a			
おけら		収穫60日前まで (雑草発生前)	200～ 300mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a			
みしまさいこ とうすけぼうふう びやくし		は種後出芽前 (雑草発生前)	300mℓ /10a	100ℓ /10a			
せんきゅう		萌芽後(雑草発生前) 但し収穫120日前まで					
とうき いんちんこう		定植後(雑草発生前) 但し収穫120日前まで					
食用ぎく		定植前(雑草発生前)	200～ 400mℓ /10a	70～ 150ℓ /10a	1回		
きく		定植後(雑草発生前)					
りんどう		萌芽前(雑草発生前)					
チューリップ		植付後萌芽前 (雑草発生前)	300～ 500mℓ /10a				
すぎ(床替床) ひのき (床替床)		床替後 (雑草発生前)	400～ 500mℓ /10a	100～ 200ℓ /10a			
桑		春期発芽前 又は夏切後 (雑草発生前)	300～ 400mℓ /10a		2回 以内	2回以内	