

ゴーゴーサンは さといもの「土寄せ後」に全面散布できる様になりました!!

1 さといもの適用内容 (2021年6月現在)



ゴーゴーサン[®] 乳剤 除草剤分類 3 ※砂土では使用しないでください。

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
さといも	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	200~400ml	70~100ℓ	1回*	全面土壌散布	2回以内 (土寄せ後の処理は1回以内)
		土寄せ後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで		100ℓ			

*植付後萌芽前で1回、土寄せ後に1回使用できます。



ゴーゴーサン[®] 細粒剤F 除草剤分類 3

作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数
さといも	一年生雑草	植付前(雑草発生前)	全土壌	4~6kg	1回*	全面土壌散布	全域	2回以内 (土寄せ後の処理は1回以内)
		植付後萌芽前(雑草発生前)土寄せ後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで	砂壤土~埴土				全域 (北海道を除く)	


*植付前または植付後萌芽前で1回、土寄せ後に1回使用できます。

2 さといもの使用方法



散布時のポイント

ゴーゴーサンは雑草の発生前にご使用ください。
※ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数:2回以内(土寄せ後の処理は1回以内)



土寄せ後に雑草が繁茂している場合、バスタ⇒ゴーゴーサンの体系除草がおすすめ!



← 植付前

→ 畦間処理(収穫30日前まで)

【ゴーゴーサンQ&A】

Q ゴーゴーサンがさといもの茎葉部に
かかっても大丈夫?

A 大丈夫です。
ゴーゴーサンは土寄せ後のさといもにかかっても、薬害リスクが低く、安心して
使える薬剤です。

3 さといも(土寄せ後散布)での試験事例



ゴーゴーサン細粒剤F 処理区



無処理区

■試験概要

- 試験機関: 埼玉県川越農林振興センター
- 試験圃場: 狭山市堀金(規模: 30a)
- 定植日: 令和2年3月21日
- 品種: 土垂
- 耕種概要: 定植後黒マルチ及び生分解マルチ被覆萌芽後マルチ切開
6月上旬マルチ剥き
- 処理月日: 6月20日(土寄せ後、里芋草丈1.5m)
- ゴーゴーサン散布量: 5kg/10a
- 散布方法: 粒剤サンバーで畦間歩行で全面散布
- 調査: 9月1日

■無処理区発生雑草と効果

- スベリヒユ ○ カヤツリグサ ○ ナギナタコウジュ ○
- シロザ ○ メヒシバ ○ オヒシバ ○ エノキグサ ○
- ニワホコリ ○ コニシキソウ ○ イヌガラシ ○

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。
●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

