

## 殺菌剤

# シグナム® WDG

®=BASF社の登録商標



殺菌剤分類 11, 7

有効成分

ピラクロストロビン ..... 6.7%

ボスカリド ..... 26.7%

登録番号：第22290号

性 状：褐色水和性細粒  
及び微粒

毒 性：普通物\*

有効年限：5年

包 装：(100g×10袋)×6箱  
333g×30袋  
500g×20袋

\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用病害と使用方法

(2021年8月11日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む農薬の総使用回数
ねぎ	べと病 黒斑病 さび病	1500倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
たまねぎ	灰色腐敗病	500倍	—	定植直前	1回	5分間 苗根部 浸漬	4回以内 (定植前は 1回以内、 定植後は 3回以内)	4回以内 (定植前は 1回以内、 定植後は 3回以内)
	灰色腐敗病 灰色かび病 べと病 小菌核病 白色疫病	1500倍	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前 まで	3回以内	5分間 セル苗 浸漬		
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病	1500～ 2000倍			2回以内	散布	2回以内	2回以内
	べと病							
はくさい	菌核病 炭疽病	1500倍	3回以内	3回以内	3回以内	3回以内		
	白斑病 黒斑病 べと病 白さび病	1500～ 2000倍						

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む農薬の総使用回数				
なす	灰色かび病 菌核病 うどんこ病 褐色斑点病	1500倍	100～ 300ℓ /10a			散布	3回以内	3回以内				
	すすかび病	1500～ 2000倍										
トマト ミニトマト	葉かび病 灰色かび病 すすかび病 うどんこ病 菌核病	2000倍							収穫前日 まで	2回以内	2回以内	3回以内
ピーマン	うどんこ病 炭疽病 黒枯病 灰色かび病 斑点病											
とうがらし類	うどんこ病 炭疽病 黒枯病 灰色かび病	1500～ 2000倍							2回以内	2回以内	2回以内	
すいか	炭疽病 うどんこ病 つる枯病											
かぼちゃ	うどんこ病	1500～ 2000倍							3回以内	3回以内	3回以内	
にんじん	黒葉枯病 うどんこ病 斑点病	1500倍										
にんにく	さび病 白斑葉枯病 黄斑病 葉枯病	2000倍							収穫14日前 まで	2回以内	2回以内	3回以内
レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病	1500倍							収穫3日前 まで	3回以内	3回以内	
	べと病		1500～ 2000倍	収穫7日前 まで	2回以内	2回以内						
非結球 レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病	1500倍	収穫14日前 まで	2回以内	2回以内							
	べと病	1500～ 2000倍										
ブロッコリー	菌核病 黒すす病	1500倍	収穫7日前 まで	2回以内	2回以内							
	べと病	1500～ 2000倍										
いちご	灰色かび病	2000倍	収穫前日 まで	2回以内	2回以内							
	うどんこ病 炭疽病											
バジル	べと病	2000倍	収穫3日前 まで	2回以内	2回以内							

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロピンを含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む農薬の総使用回数
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	1500倍	100～ 500ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病 さび病		100～ 300ℓ /10a					
	うどんこ病	1500～ 2000倍						
未成熟 とうもろこし	すす紋病	2000倍		収穫7日前 まで				