

殺菌剤

ザンプロDM[®]フロアブル

[®]=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **45.40**

有効成分

アメトクトラジン 27.0%

ジメトモルフ 20.3%

登録番号：第23455号

性 状：類白色水和性
粘稠懸濁液体

毒 性：普通物*

有効年限：3年

包 装：1ℓ×12本
250ml×20本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用病害と使用方法

(2021年10月13日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アメトクトラジンを含む農薬の総使用回数	ジメトモルフを含む農薬の総使用回数
小粒種ぶどう	べと病	2000~3000倍	200~700ℓ /10a	収穫45日前まで	2回以内	散布		2回以内
大粒種ぶどう			100~300ℓ /10a	収穫30日前まで				
ばれいしょ	疫病	1000~1500倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	3回以内
		250倍	25ℓ /10a					
		8倍	0.8ℓ /10a					
		16倍	1.6ℓ /10a					
		32倍	3.2ℓ /10a					
トマト ミニトマト		1500倍						
きゅうり	べと病	1500~2000倍	100~300ℓ /10a	収穫7日前まで		散布		
たまねぎ	べと病 白色疫病	8倍	0.8ℓ /10a					
		16~24倍	1.6ℓ /10a					

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アクトクラジンを含む農薬の総使用回数	ジメトモルフを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	べと病	1500～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内	
		8倍	0.8ℓ /10a			無人航空機による散布			
		16～24倍	1.6ℓ /10a						
レタス はくさい		1500～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫3日前まで		散布			
だいず		茎疫病	8～16倍	0.8～1.6ℓ /10a		収穫7日前まで			無人航空機による散布
			1000～1500倍	100～300ℓ /10a					散布
	8～12倍	0.8～1.2ℓ /10a	無人航空機による散布						
	あずき	1000倍	100～300ℓ /10a	散布					
8倍		0.8ℓ /10a	無人航空機による散布						
16倍		1.6ℓ /10a							
たばこ	疫病	1000～1500倍	100～180ℓ /10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	