

たまねぎに『やっぱりゴーゴーサン』!

1 たまねぎの適用内容 (2021年10月現在)

ゴーゴーサン[®] 乳剤 除草剤分類 3



作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数
			薬量	希釈水量			
たまねぎ(直播栽培)	一年生雑草	は種後～本葉2葉期(雑草発生前)	200～400ml	70～100ℓ	1回	全面土壌散布	1回
たまねぎ(移植栽培)		定植前(雑草発生前) 定植後(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで	300～500ml	70～150ℓ			

※砂土では使用しないでください。

ゴーゴーサン[®] 細粒剤F 除草剤分類 3




作物名	適用雑草名	使用時期	適用土壌	10アール当り使用量	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数
たまねぎ(春播栽培)	一年生雑草	定植後(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで	砂壤土～ 埴土	5～6kg	1回	全面土壌散布	全域	1回
たまねぎ(秋播栽培)		定植後又は生育期(雑草発生前) 但し、収穫30日前まで						
たまねぎ(秋播マルチ栽培)		定植前(マルチ前)	全土壌					


2 たまねぎへの使用方法

たまねぎ〈マルチなしの場合〉

〔移植栽培の場合：散布A、Bどちらか1回〕



たまねぎ〈マルチ栽培の場合〉



使用上のポイント

■ マルチ栽培、マルチなしどちらにも使用できます。 ■ 定植後、全面散布が可能です。

3 BASFのたまねぎ用農薬ラインナップ

べと病専用殺菌剤

ザンプロDM[®]フロアブル

- ドローン散布も可能*
- 2成分で疫病の予防、治療効果を発揮
- ワックス層によく吸着され耐雨性に優れる



登録内容は
こちらを
ご確認ください



*24倍・1.6ℓ/10a

たまねぎのべと病・小菌核病・ 灰色かび病防除に!

シグナムWDG



登録内容は
こちらを
ご確認ください



2成分& 新規たまねぎ除草

モーティブ[®] 乳剤



登録内容は
こちらを
ご確認ください



非選択性除草剤

バスター



登録内容は
こちらを
ご確認ください



●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

