

除草剤

BASF バサグラン[®] 液剤

(ナトリウム塩) [®]=BASF社の登録商標



除草剤分類 **6**

有効成分

ベンタゾン(Na塩) 40.0%

登録番号：第21254号

性 状：赤色澄明
水溶性液体

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：3ℓ×6本

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2021年11月24日現在)

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数*	使用方法
			薬量	希釈水量		
移植水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ コウキヤガラ エゾノサヤヌカグサ シズイ クサネム	移植後15～55日 但し 収穫50日前まで	500～ 700mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a	2回 以内	落水散布 又はごく 浅く湛水 して散布
直播水稻	一年生雑草 (イネ科を除く) マツバイ ホタルイ ウリカワ オモダカ ミズガヤツリ ヘラオモダカ クログワイ	は種後35～50日 但し 収穫50日前まで				

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびベンタゾンを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		総使用回数*	使用方法
			薬量	希釈水量		
たまねぎ	一年生雑草 (イネ科を除く)	春播栽培の移植後 6月上旬まで 但し収穫30日前まで	60～ 120mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a	1回	雑草茎葉 散布又は 全面散布
		秋播栽培の移植後 生葉4葉期まで 但し収穫30日前まで				
らっきょう		出芽後 但し収穫60日前まで	100～ 200mℓ /10a			
いんげんまめ		初生葉展開期～ 本葉抽出始期	50～ 70mℓ /10a			
えんどうまめ		3～6葉期 但し収穫70日前まで	100～ 200mℓ /10a			
実えんどう さやえんどう		3～6葉期 但し収穫40日前まで				
とうもろこし 飼料用とうもろこし		生育期 但し収穫50日前まで	100～ 150mℓ /10a			
ソルガム		生育期 但し収穫30日前まで				
麦類 (小麦を除く)		生育期 但し収穫90日前まで	100～ 200mℓ /10a			
小麦		生育期 但し収穫45日前まで				
はとむぎ			150mℓ /10a		2回 以内	
おうぎ		生育期 但し収穫30日前まで	200mℓ /10a			100ℓ /10a
せり	親株養成期 植付45～60日後まで					
べにばないんげん	生育期 但し収穫45日前まで	100～ 200mℓ /10a	70～ 100ℓ /10a	1回	畦間雑草 茎葉散布	

*印は収穫物への残留回避のため、本剤およびベンタゾンを含む農薬の総使用回数の制限を示す。