

除草剤

フィールドスター®P乳剤

®=BASF社の登録商標

除草剤分類 **15**

有効成分

ジメテナミドP 64.0%

登録番号：第22777号


性 状：暗褐色可乳化
油状液体

毒 性：普通物*

危 険 物：三石・水溶性・Ⅲ

有効年限：5年

包 装：500ml×20本
2ℓ×10本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■適用雑草と使用方法

(2021年12月17日現在)

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の 使用 回数 | 使用 方法 | ジメテナミドおよび ジメテナミドPを含む 農薬の総使用回数 | |
|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|-----------------|----------------|-------------------------------------|--------------|
| | | | 薬量 | 希釈水量 | | | | |
| キャベツ | 一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を除く) | 定植後 (雑草発生前) 但し定植後 10日まで | 50~ 75ml /10a | 100ℓ /10a | 1回 | 全面 土壌 散布 | 1回 | |
| ブロッコリー | | 定植後 (雑草発生前) 但し収穫 30日前まで | | | | | | |
| カリフラワー | | 定植後 (雑草発生前) 但し定植後 30日まで | | | | | | |
| たまねぎ | | は種後出芽前 (雑草発生前) | 75~ 120ml /10a | 100ℓ /10a | | | | |
| えだまめ だいず | | とうもろこし 飼料用 とうもろこし | | | | | | 100ℓ /10a |
| いんげんまめ | | 一年生 イネ科雑草 | | | | | | |
| ばれいしょ | 一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を除く) | 植付後萌芽前 (雑草発生前) | 70~ 150ℓ /10a | | | | | |

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ジメテナミドおよびジメテナミドPを含む農薬の総使用回数 |
|----------------|--------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|----------------|-----------------------------|
| | | | 薬量 | 希釈水量 | | | |
| てんさい (移植栽培) | 一年生雑草 (アカザ科・ アブラナ科・ タデ科を除く) | 定植後または 中耕後 雑草発生前 但し収穫 45日前まで | 75～ 120mℓ /10a | 70～ 100ℓ /10a | 2回 以内 | 全面 土壌 散布 | 2回以内 |
| てんさい (直播栽培) | 一年生 イネ科雑草 | 出芽前期 (雑草発生前) | 75mℓ /10a | 100ℓ /10a | | | |