BASF
We create chemistry

農林水産省登録 第24439号

サンケイ

コテツ®ベイト

難防除害虫ホウレンソウケナガコナダニに効く

®＝BASF社の登録商標

コナダニ防除の常識は ベイトで変える。

特長

- 難防除害虫である ホウレンソウケナガコナダニに卓効
- 害虫を誘引し食毒により防除
- 混和する必要なく、処理が簡便
- 優れた残効性

ベイト粒

圃場に撒くだけで害虫を誘引

ホウレンソウ
ケナガコナダニ

殺虫剤

サンケイ

コテツ®ベイト

®＝BASF社の登録商標

殺虫剤分類 13

農薬登録番号：第24439号
有効成分：クロルフェナピル…0.5%
人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指していう総称）
包装：2kg×8袋

いままで難しかったケナガコナダニ防除は、コテツベイトが解決します。

■ 使い方



全面散布処理なので、土壌混和する必要はありません。

ベイト剤の作用性

- ケナガコナダニがほうれんそう株へ移動する際にベイト剤へ誘引します。
- ベイト剤に誘引されたケナガコナダニが薬剤を摂食することによる食毒作用により効果を発揮します。

コテツベイトはケナガコナダニに対するクロルフェナピルの活性を最大化できるよう工夫された製剤です。



■ 防除効果（日植防委託試験成績書）

ホウレンソウケナガコナダニに対する効果



秋田県農業試験場
（2019年：秋田県秋田市　農試圃場内ハウス）

供試作物：ほうれんそう（品種：ドンキー）
　　8㎡/1区　3反復
は　　種：2019年8月23日
対象害虫発生状況：少発生（放虫）
処　理　日：コテツベイト（8月23日：は種時1回全面土壌散布）
　　A剤（8月23日：は種前1回全面土壌混和）
調　査　日：散布前（8月23日）、散布7日後（8月30日）、
　　散布16日後（9月8日）、散布23日後（9月15日）、
　　散布33日後（9月25日：収穫期）
土壌中密度：酵母トラップ（春日方式）　4地点／1区
　　各区表層（5㎝深）の土壌各100mℓ中のコナダニ
　　数合計／3反復の平均値

コテツベイトは優れた残効性が確認されています

■ 適用病害虫名と使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルフェナピルを含む農薬の総使用回数
ほうれんそう	ホウレンソウケナガコナダニ	3～6kg/10a	は種時～2葉期まで 但し、収穫14日前まで	1回	全面土壌散布	1回

⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- 所定量の薬剤を圃場全体に均一に散布してください。
- 全面土壌散布の場合は施設内の使用に限ります。施設外に飛散させないでください。（2021年12月に追加）
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。

⚠ 貯蔵上の注意事項

- 直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

★ 使用前にはラベルをよく読んでください。★ ラベルの記載以外には使用しないでください。
★ 小児の手の届くところには置かないでください。
★ 使用後の空容器等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。
★ 防除日誌を記帳しましょう。

※この資料は2022年1月現在の知見に基づき作成したものです。

BASFジャパン株式会社
東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
0120-014-660　https://crop-protection.basf.co.jp/

詳細はWEBでもご覧いただけます

BASF-0191 3
202201