

## 殺菌剤

# ナリア<sup>®</sup>WDG

<sup>®</sup>=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **11, 7**

有効成分

ピラクロストロビン ..... 6.8%

ボスカリド ..... 13.6%

登録番号：第21795号

性 状：褐色水和性細粒  
及び微粒

毒 性：普通物\*

有効年限：5年

包 装：250g×40袋  
500g×20袋



\* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■適用病害と使用方法

(2022年3月23日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 褐斑病 炭疽病 すす点病 すす斑病 輪紋病 黒点病 うどんこ病 腐らん病	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
なし	黒斑病 黒星病 輪紋病 うどんこ病 炭疽病							
おうとう	灰星病 炭疽病 黒斑病 褐色せん孔病 幼果菌核病							
もも	灰星病 ホモプス腐敗病 黒星病 果実赤点病 すすかび病 うどんこ病 炭疽病				2回以内		2回以内	2回以内

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピラクロストロピンを含む農薬の総使用回数	ボスカリドを含む農薬の総使用回数	
ネクタリン	灰星病 ホモブシス腐敗病 黒星病 うどんこ病 炭疽病	2000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内	
かき	落葉病 炭疽病 うどんこ病	2000～ 3000倍		収穫7日前 まで	3回以内		3回以内	3回以内	
大粒種 ぶどう	晩腐病	2000倍		収穫14日 前まで					
かんきつ	そうか病 黒点病 灰色かび病	2000～ 2500倍		炭疽病(さび果) 小黒点病	収穫7日前 まで		2回以内	2回以内	2回以内
	小粒核果類 (うめ、すも もを除く)	黒星病 灰星病							
うめ	黒星病 環紋葉枯病 すす斑病 灰色かび病 灰星病	2000倍		収穫前日 まで	2回以内		2回以内	2回以内	2回以内
すもも	黒星病 灰星病 ふくろみ病								
キウイ フルーツ	灰色かび病 すす斑病 果実軟腐病								
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 もち病 網もち病 褐色円星病 黒葉腐病 赤葉枯病	200～ 400ℓ /10a		摘採7日前 まで	3回以内		3回以内	3回以内	3回以内
ホップ	べと病 うどんこ病	200～ 700ℓ /10a		収穫14日 前まで					