


**□・BASF**  
We create chemistry

畑作用除草剤

# ゴゴガン<sup>®</sup> 乳剤 細粒剤F

®=BASF社の登録商標



## 幅広い適用雑草で、 イネ科・広葉雑草もまとめて防除！

**1** 風に強い細粒剤F  
分散性が高く  
小さくて重いので、  
風に強く比較的日を選ばず散布できます。

**2** 幅広い適用雑草  
土壌処理で  
イネ科・広葉雑草  
を同時に防除

**3** 40~60日の  
効果持続性  
雑草の発生を  
40~60日の  
長期間抑制可能



ナスナ




スズメノカタビラ



イヌビエ



イヌビユ



ハコベ

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数
			薬量(mL)	希釈水量(L)			
はくさい	一年生雑草	定植前(雑草発生前)	200~300	70~150	1回	全面土壌散布	1回
キャベツ、カリフラワー、レタス、非結球レタス		200~400					
うど		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)	400	100		2回以内 (畦間処理は1回以内)	
たまねぎ(直播栽培)		生育期(根株養成圃)(雑草発生前)但し収穫60日前まで	200~400				
たまねぎ(移植栽培)		は種後~本葉2葉期(雑草発生前)	200~400	70~100		全面土壌散布	
葉たまねぎ		定植前(雑草発生前)	300~500				
らっきょう		定植後(雑草発生前)但し収穫30日前まで	300~500	70~150		全面土壌散布	
ねぎ		定植前(雑草発生前)	200~300				
にら		定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで	200~300	100		畦間土壌散布	
にんにく		収穫30日前まで(雑草発生前)	300~500				
葉にんにく(マルチ栽培)		植付前(マルチ前)	300~500	70~150		全面土壌散布	
葉にんにく(マルチ栽培を除く)		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	400~500				
ふき(春どり露地栽培)		植付前(マルチ前)	400~500	100		全面土壌散布	
ふき(ふきのとう)		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	300~400				
かんしょ		春期収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	400	70~150		畦間土壌散布	
さといも		春期ふき収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	200~400				
ばれいしょ		挿苗10日後まで(雑草発生前)	200~400	70~100		2回以内 (土寄せ後の処理は1回以内)	
やまのいも		植付後萌芽前(雑草発生前)	200~300				
しょうが		植付後又は培土後(雑草発生前)但し植付30日後まで	200~400	70~150		全面土壌散布	
ごんじゃく		200~300					
らっかせい	は種後(雑草発生前)	200~400	70~150	全面土壌散布			
にんじん、とうもろこし、飼料用とうもろこし	は種後(雑草発生前)	200~400					
ヤングコーン	は種後(雑草発生前)~小麦2葉期(イネ科雑草1葉期まで)	300~500	70~100	雑草茎葉散布又は全面土壌散布			
陸稲	300						
麦類(小麦を除く)	ソルガム3葉期(雑草発生前~発生初期)	300	70~150	全面土壌散布			
小麦	は種後(雑草発生前)	300~400					
ソルガム	は種後(雑草発生前)	200~400	100	全面土壌散布			
アスパラガス	萌芽前(雑草発生前)	200~400					
とりかぶと(薬用)	生育期(雑草発生前)但し収穫90日前まで	300~500	100	全面土壌散布			
食用ぎく	定植前(雑草発生前)	200~400					
きく	定植後(雑草発生前)	200~400	70~150	全面土壌散布			
りんどう	萌芽前(雑草発生前)	300~500					
チュウリップ	植付後萌芽前(雑草発生前)	300~500	100~200	2回以内 3回以内 (1年間に1回以内)			
桑	春期発芽前又は夏切後(雑草発生前)	300~400					
おけら	収穫60日前まで(雑草発生前)	200~300	70~150	1回			
すぎ(床替床)、ひのき(床替床)	床替後(雑草発生前)	400~500					
せんきゅう	萌芽後(雑草発生前)但し収穫120日前まで	100	70~150	1回			
みしまさいこ、とうすげぼうふう、びやくし	は種後(雑草発生前)	300					
とうき、いんちんこう	定植後(雑草発生前)但し収穫120日前まで	300	100	3回以内 (1年間に1回以内)			
甘草	は種後(雑草発生前)	300					
		定植後(雑草発生前)但し収穫90日前まで					
		越冬後萌芽前(雑草発生前)					

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量(kg)	本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数	
麦類、とうもろこし、飼料用とうもろこし	一年生雑草	は種後(雑草発生前)	5~6	1回	全面土壌散布	1回	
ヤングコーン			4~6				
陸稲、ソルガム			4~5				
にんじん			5				
らっかせい			4~6				
さといも		植付前(雑草発生前)	4~6			1回	2回以内
ばれいしょ(マルチ栽培を除く)		植付後萌芽前(雑草発生前)					
ばれいしょ(マルチ栽培)		土寄せ後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで					
キャベツ		植付後マルチ前、但し、萌芽前まで(雑草発生前)	4~5			1回	2回以内
はくさい、レタス、非結球レタス		定植前又は定植後~定植翌日(雑草発生前)					
アスパラガス		定植前(雑草発生前)	4~6			1回	2回以内
にんにく、葉にんにく		萌芽前(雑草発生前)					
たまねぎ(春播栽培)		植付前(マルチ前)	5~6			1回	2回以内
たまねぎ(秋播栽培)		植付後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで					
たまねぎ(秋播マルチ栽培)		定植後(雑草発生前)但し、収穫30日前まで	4~6			1回	2回以内
葉たまねぎ		定植後又は生育期(雑草発生前)但し、収穫30日前まで					
ねぎ		定植前(マルチ前)	4~6			1回	2回以内
ごんじゃく		定植後(雑草発生前)但し、定植10日後まで					
桑		植付後又は培土後(雑草発生前)但し、植付30日後まで	5~6			2回以内	2回以内
パセリ		春期発芽前又は夏切後(雑草発生前)					
みしまさいこ	は種後(雑草発生前)	5	1回	2回以内			
チュウリップ	は種後(雑草発生前)						
つつじ類	は種後~発芽前又は萌芽期(雑草発生初期まで)	4~6	1回	2回以内			
しょうが	植付後萌芽前(雑草発生前)						
きく	生育期(雑草発生前)	4	1回	2回以内			
うど	定植後(雑草発生前)						
		畑苗床での定植後(雑草発生前)(入水15日前まで)	4	1回	2回以内 (畦間処理は1回以内)		
		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)	5				
		生育期(根株養成圃)(雑草発生前)但し、収穫60日前まで					

●使用時にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記載しましょう。