

殺菌剤

カンタス[®]ドライフロアブル[®]

® (R)=BASF社の登録商標



殺菌剤分類 **7**

有効成分

ボスカリド 50.0%

登録番号：第21468号

性 状：褐色水和性微粒

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：(100g×10袋)×6箱
667g×20袋
1kg×10袋

* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■特長

- 灰色かび病、菌核病の両病害に顕著な効果を発揮します。
- 他剤耐性菌にも有効です。
- 有効成分がスムーズに葉内に浸達します。
- 残効性、耐雨性にすぐれます。
- 予防効果にすぐれます。
- 有用昆虫に影響が少ないです。

■適用病害と使用方法

(2022年6月8日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ボスカリドを含む農薬の総使用回数
かんきつ	灰色かび病	1500倍	200～700ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
大粒種ぶどう	灰色かび病 すす点病	1000～1500倍		収穫7日前まで			
小麦	眼紋病 うどんこ病	1500倍	60～150ℓ /10a	収穫45日前まで	2回以内		2回以内
いちご	灰色かび病	1000～1500倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
トマト ミニトマト	灰色かび病 菌核病 葉かび病						
なす	灰色かび病 菌核病 すすかび病						

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ボスカリドを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	灰色かび病 菌核病	1000～ 1500倍	100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内		
	褐斑病	1500倍							
メロン すいか	菌核病	1000～ 1500倍		収穫14日前まで	2回以内			2回以内	
にんじん	黒葉枯病 斑点病			収穫7日前まで					
レタス	灰色かび病 菌核病	1500倍		収穫14日前まで	1回			1回	
非結球レタス				収穫7日前まで					
くきちしゃ				収穫7日前まで					
エンダイブ	菌核病	1500倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内	
トレビス									
キャベツ	菌核病 株腐病 黒斑病	1500倍		1回	1回			1回	
なばな類	菌核病								
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病	1000～ 1500倍		収穫前日まで	3回以内			3回以内	4回以内 (定植前は 1回以内、 定植後は 3回以内)
	小菌核病	1500倍							
豆類 (種実、但し、 らっかせい、 あずき、いんげ んまめを除く)	菌核病	1500倍		収穫7日前まで	2回以内			2回以内	
あずき	灰色かび病 菌核病	1000～ 1500倍		収穫21日前まで	3回以内			3回以内	
	さび病	1500倍							
いんげんまめ	灰色かび病 菌核病	1000～ 1500倍		収穫前日まで	2回以内			2回以内	
さやいんげん	1000倍								
未成熟そらまめ	赤色斑点病 さび病	1000倍		収穫前日まで	3回以内			3回以内	
さやえんどう 実えんどう	灰色かび病								
ブロッコリー	菌核病	1500倍		収穫7日前まで	3回以内			3回以内	
らっきょう	灰色かび病								
ピーマン	灰色かび病 黒枯病	1000～ 1500倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内				
とうがらし類									
食用ぎく	灰色かび病	1000倍	収穫7日前まで	2回以内	2回以内				
プンタレッラ		1500倍	収穫3日前まで						

マイナー作物等の登録拡大に伴いグループ化した作物名

グループ化した作物名	含まれる作物(品種)
非結球レタス	かきちしゃ、サラダ菜、立ちちしゃ、美味タス、リーフレタス
豆類(種実)	あずき、いんげんまめ、えんどうまめ、ささげ、そらまめ、だいず、なたまめ、ふじまめ、べにばないんげん、らっかせい

農薬登録における作物群の作物名について(2021年1月14日改正)「農薬の適用病害虫の範囲および使用方法に係る適用作物等の名称について」(2019年3月29日付け30消安第6281号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)農林水産消費安全技術センターホームページをご参照ください。
<http://www.acis.famic.go.jp/shinsei/6281.pdf>

表の使用に際しては以下の事項に留意してください。

注1 現在、農薬の適用作物には含まれていない作物を含みます。適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合があります。

注2 品種名及び栽培条件(施設栽培等)等については省略している場合がありますが、農薬登録時に品種名又は栽培条件等の指定がある場合は、当該品種又は栽培条件等にのみ使用できるものです。

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- きゅうりに使用する場合、高温条件や散布後急激に乾燥すると葉焼けや日焼け果の発生を助長するおそれがあるので注意してください。
- 果菜類、ぶどうに使用する場合、浸透性を高める効果のある展着剤や葉面液肥を加用すると薬害が生じるおそれがあるので、さけてください。
- みずかけな(水掛菜)に使用する場合は、ほ場内に水がない状態で使用してください。また、使用后14日間は入水しないでください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

〈非結球レタス・豆類(種実)について〉

- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

保 管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

