

殺菌剤

アクサー[®] フロアブル[®] ®=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **3, 7**

有効成分

ジフェノコナゾール(PRTR・1種) …… 4.7%

フルキサピロキサド(通称名：ゼミウム[®]) … 7.0%

登録番号：第24183号

性 状：類白色水和性
粘稠懸濁液体

毒 性：普通物*

有効年限：3年

包 装：250ml×20本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■特長

- 幅広い病害スペクトラム：2つの異なる有効成分により幅広い病害に安定した効果を示します。
- 耐性菌管理に有効：作用機作の異なる成分により耐性菌管理にも有効です。
- 優れた移行性：ゼミウム[®]は、ワックス層に対して高い親和性を持ち、継続的に葉内に取り込まれます。

■適用病害と使用方法

(2023年12月20日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフェノコナゾールを含む農薬の総使用回数	フルキサピロキサドを含む農薬の総使用回数
りんご	モニリア病 黒星病 うどんこ病 黒点病 斑点落葉病 赤星病 灰色かび病 褐斑病	2000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫 14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内
なし	黒星病 黒斑病 うどんこ病 赤星病 輪紋病							
おうとう	灰星病 炭疽病 幼果菌核病			収穫 前日 まで	2回以内	2回以内	2回以内	2回以内
もも	灰星病 黒星病							
ネクタリン	ホモプシス腐敗病 うどんこ病							

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用に当たっては容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製の際は、水をかきませながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。使用後は洗眼してください。
- 火災時は、適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努めてください。
- 漏出時は、保護具を着用し、布・砂等に吸収させ回収してください。
- 移送取扱いは、ていねいに行ってください。
- 直射日光を避け、食品と区別してなるべく低温な場所に密栓して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

