

## 殺菌剤

# ザンプロDM<sup>®</sup>フロアブル

<sup>®</sup>=BASF社の登録商標



殺菌剤分類 **45.40**

有効成分

アメトクトラジン ..... 27.0%

ジメトモルフ ..... 20.3%

登録番号：第23455号

性状：類白色水和性  
粘稠懸濁液体

毒性：普通物\*

有効年限：3年

包装：1ℓ×12本  
250ml×20本

\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■特長

- 二つの有効成分で、疫病・べと病の生活環のほぼ全てのステージを強く阻害します。
- 葉面ワックス層に対して高い親和性を有することで、高い耐雨性および残効性を示します。
- 浸達性を有し、治療的効果も有します。

## ■適用病害と使用方法

(2023年12月20日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アメトクトラジンを含む農薬の総使用回数	ジメトモルフを含む農薬の総使用回数
小粒種ぶどう	べと病	2000~3000倍	200~700ℓ /10a	収穫45日前まで	2回以内	散布	3回以内	3回以内
大粒種ぶどう				収穫30日前まで				
ばれいしょ	疫病	1000~1500倍	100~300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	無人航空機による散布	3回以内	3回以内
		250倍	25ℓ /10a					
		8倍	0.8ℓ /10a					
		16倍	1.6ℓ /10a					
		32倍	3.2ℓ /10a					
トマト ミニトマト		1500倍	100~300ℓ /10a			散布		

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アクトクラジンを含む農薬の総使用回数	ジメトモルフを含む農薬の総使用回数		
きゅうり	べと病	1500～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	3回以内		
たまねぎ	べと病 白色疫病	8倍	0.8ℓ /10a	収穫7日前まで		無人航空機による散布				
		16～24倍	1.6ℓ /10a			散布				
ねぎ	べと病	1500～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで		無人航空機による散布				
		8倍	0.8ℓ /10a			散布				
		16～24倍	1.6ℓ /10a			無人航空機による散布				
キャベツ	べと病	1500～2000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで		散布			3回以内	3回以内
非結球レタス		1500倍		収穫3日前まで						
レタス はくさい		1500～2000倍		無人航空機による散布						
だいず		8～16倍								
	だいず	茎疫病	1000～1500倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	散布				
8～12倍			0.8～1.2ℓ /10a	無人航空機による散布						
あずき	茎疫病	1000倍	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	散布					
		8倍	0.8ℓ /10a		無人航空機による散布					
		16倍	1.6ℓ /10a							
たばこ	疫病	1000～1500倍	100～180ℓ /10a	収穫10日前まで	2回以内	散布	2回以内	2回以内		

## ⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用に当たっては容器を良く振って下さい。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用して下さい。
- ばれいしょに対して希釈倍数250倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用して下さい。
- ぶどうに使用する場合は、果粉溶脱のおそれがあるので大豆大以降の散布をさけて下さい。
- 無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意して下さい。
  - ①散布機種 of 散布基準に従って実施して下さい。
  - ②散布機種に適合した散布装置を使用して下さい。
  - ③散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行って下さい。
  - ④散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意して下さい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けて下さい。

## ⚠ 安全使用上の注意事項

- 誤飲などのないよう注意して下さい。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせて下さい。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けて下さい。
  - 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意して下さい。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落として下さい。
  - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用して下さい。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをして下さい。
  - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意して下さい。
- 保 管**…直射日光を避け、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密栓して保管して下さい。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、  
またはクリックしてください。

