

# 同じに見えても“選ばれる違い”

フレキシパワーが魅せる、新しい価値



フレキシブル+パワー  
=フレキシパワー

殺菌剤

## ベランティーフロアブル<sup>®</sup>

Powered by Revysol<sup>®</sup> Active

**□・BASF**

We create chemistry

## ベランティー®フロアブル



®=BASF社の登録商標

Powered by Revysol® Active

有効成分：レビゾール®(メフェントリフルコナゾール)……34.9%  
人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

レビゾール®はフレキシパワーにより、DMI 低感受性菌の疑われるほ場においても安定した効果を示します。

## ベランティー®フロアブルの特長



## 適用病害虫と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフェントリフルコナゾールを含む農薬の総使用回数	被害防止方法 農薬使用者
りんご	モニリア病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 褐斑病 黒点病	8000倍	200~700 ℓ/10a	収穫 14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
なし	うどんこ病 赤星病 黒星病 黒斑病			収穫 前日まで	2回以内			
もも ネクタリン	灰星病 黒星病				3回以内			
おうとう	灰星病							
うめ	黒星病							
ぶどう	灰色かび病 黒とう病							

## △効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください。(耐性菌出現回避)。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は、(普及指導センター)病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## △安全使用上の注意

- アレルギー反応を起こすおそれがあります。

## 農薬使用者への被害防止方法

- (調製時) りんご、なし：不浸透性手袋。  
(散布時) りんご(手散布)、なし(手散布)、ぶどう(手散布)：不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣。  
りんご(乗用型機械散布)、なし(乗用型機械散布)、もも、ネクタリン(手散布)、おうとう、うめ、ぶどう(乗用型機械散布)：長ズボン・長袖の作業衣。  
保 管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所で保管してください。

●ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。●使用後の空容器はほ場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

※この資料は2024年1月現在の知見に基づき作成したものです。

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階  
☎0120-014-660 <https://crop-protection.basf.co.jp/>詳細やSDSは  
WEBでご覧  
いただけますBASF-0796  
202401