

## 殺菌剤

# ベランディーフロアブル<sup>®</sup>

<sup>®</sup> = BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **3**

有効成分  
レビゾール<sup>®</sup>  
(メフェントリフルコナゾール) …… 34.9%

登録番号：第24778号  
性 状：類白色～  
淡褐色水和性  
粘稠懸濁液体  
毒 性：普通物\*  
有効年限：5年6か月  
包 装：125ml×20本



\* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■特長

- レビゾール<sup>®</sup>のユニークな構造式(フレキシパワー)により、安定した効果と高い安全性が得られます。
  - ・DMI低感受性菌に対する安定した効果(地域により低感受性菌の発生状況は異なる)。
  - ・作物、哺乳類、有用昆虫に対する安全性。

## ■適用病害と使用方法

(2024年1月18日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフェントリフルコナゾールを含む農薬の総使用回数	被害防止方法
								使用者
りんご	モニリア病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 褐斑病 黒点病	8000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内	
なし	うどんこ病 赤星病 黒星病 黒斑病							
もも	灰星病 黒星病			収穫前日 まで	2回以内		2回以内	
ネクタリン								
おうとう	灰星病			3回以内	3回以内		3回以内	
うめ	黒星病							
ぶどう	灰色かび病 黒とう病							

## ⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください(耐性菌出現回避)。
- 使用量、使用時期、使用方法を守って下さい。特に初めて使用する場合は、(普及指導センター、)病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## ⚠ 安全使用上の注意

- アレルギー性反応を起こすおそれがあります。  

## 🚶 農薬使用者への被害防止方法

### ・調整時

りんご、なし：不浸透性手袋。

### ・散布時

りんご(手散布)、なし(手散布)、ぶどう(手散布)：不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣。

りんご(乗用型機械散布)、なし(乗用型機械散布)、もも、ネクタリン(手散布)、おうとう、うめ、ぶどう(乗用型機械散布)：長ズボン・長袖の作業衣。

**保 管**…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所で保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、  
またはクリックしてください。

