

植物成長調整剤

サイコセル[®]PRO

[®]=BASF社の登録商標



有効成分
クロルメコート 65.8%

登録番号：第23589号
性 状：淡黄色澄明
水溶性液体
毒 性：医薬用外劇物
有効年限：5年
包 装：3ℓ×6本

■特長

- 小麦の節間伸長を抑制し、倒伏を軽減します。
- 倒伏による減収、品質劣化を防止し、収穫作業の効率を改善します。
- 秋まき小麦の幼穂形成期にも散布可能です。

■適用作物と使用方法

(2024年1月31日現在)

作物名	使用目的	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	適用地帯	クロルメコートを含む農薬の総使用回数	
小麦(春播)	茎稈の伸長抑制	150mℓ /10a	100ℓ /10a	6葉期前後 (草丈30~40cm)	1回	茎葉散布	北海道	1回	
小麦(秋播)		150~200mℓ /10a		幼穂形成期				2回以内 (幼穂形成期は1回以内、幼穂形成期後は1回以内)	
		200~300mℓ /10a		出穂前20~10日 (草丈約40~60cm)					東北以南
				出穂前40~20日 (幼穂形成期後~第2節出現期)					

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤散布によりときには葉面に黄化症状を呈することがあるので、使用の際は伸長を過度に抑制させないためにも、必ず指定濃度を守り、多量散布にならないよう葉面が均一に濡れる程度に散布してください。また、晴天の日は日中散布をさけ、夕方に散布してください。
- 本剤散布直後の降雨・灌水は効果を減するので、天候を見きわめ灌水後に散布してください。
- 本剤は極端な多肥栽培、密植栽培では小麦に対する効果が劣るので注意してください。

- 薬害や効果不足を生じるおそれがあるので、鉄砲ノズルおよびミスト機の使用はさけてください。
- 春播き小麦を根雪前に播種する場合(初冬播き栽培)には、春播き栽培に準じた使用量、使用時期で使用してください。
- 本剤は一般作物にも微量で影響を及ぼすことがあるので、周辺作物にかからないように注意してください。また、使用後の散布器具等は十分洗浄してください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物です。取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は防護マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤による中毒に対しては、動物実験で硫酸アトロピン製剤が中毒症状を増強するという報告があります。

保 管…直射日光をさけ、食品と区別して、鍵のかかるなるべく低温な場所に密栓して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

