

殺虫剤

セフィーナ[®] DC

[®]=BASF社の登録商標

殺虫剤分類 **9D**

有効成分

アフィドピロペン

..... 4.9%

登録番号：第24663号

性状：淡黄色～淡黄緑色
澄明水和性油状液体

毒性：普通物*

有効年限：5年

包装：250ml×20本
500ml×20本



* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■特長

- **天然物由来^{*}の吸汁阻害剤** ※有機JAS規格には適合しません。
 - ・コウジカビ由来のユニークな化学構造
 - ・既存の有機リン、合ピレ、ネオニコチノイド等への抵抗性系統にも有効
 - ・IRACグループ9のサブグループDに分類
- **環境に優しい**
 - ・ハチ類への高い安全性
 - ・有用昆虫への影響が少ない
 - ・魚類、鳥類への毒性が低い
- **ウイルス媒介抑制効果**
 - ・速効的に異常行動を誘発
 - ・異常行動による吸汁阻害効果
 - ・優れたウイルス媒介抑制効果
- **優れた残効性**
 - ・DC製剤による葉組織内への浸達性
 - ・有効成分の物化性による優れた耐雨性
 - ・長期残効性

■適用害虫と使用方法

(2024年2月28日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフィドピロペンを含む農薬の総使用回数
小麦	アブラムシ類	2000～4000倍	60～150ℓ / 10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
ばれいしょ			100～300ℓ / 10a				
てんさい							

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフィドピロペンを含む農薬の総使用回数
キャベツ	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内
はくさい							
ブロッコリー							
レタス							
非結球レタス				収穫7日前まで			

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- ミストの吸入をさけ、屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、医師の手当を受けさせてください。
- 鍵のかかる場所に保管してください。
- 換気のよいところで保管してください。容器を密閉しておいてください。

保 管…火気をさけ、食品と区別して、直射日光のあたらない低温な場所に密栓して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

