

BASF
We create chemistry

畑作用除草剤

ゴゴガン[®] 乳剤 細粒剤F

®=BASF社の登録商標



幅広い適用雑草で、 イネ科・広葉雑草もまとめて防除！

1 風に強い細粒剤F
分散性が高く
小さくて重いので、
風に強く比較的日を選ばず散布できます。

2 幅広い適用雑草
土壌処理で
イネ科・広葉雑草
を同時に防除

3 40~60日の
効果持続性
雑草の発生を
40~60日の
長期間抑制可能



ナスナ



スズメノカタビラ



イヌビエ



イヌビユ



ハコベ

作物名	適用雑草名	使用時期	10アール当たり使用量		本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数		
			薬量(mL)	希釈水量(L)					
はくさい		定植前(雑草発生前)	200~300	70~150	1回	全面土壌散布	1回		
キャベツ、カリフラワー、レタス、非結球レタス		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)	200~400						
うど		生育期(根株養成圃)(雑草発生前)但し収穫60日前まで	400	100		畦間土壌散布	2回以内 (畦間処理は1回以内)		
たまねぎ(直播栽培)		は種後~本葉2葉期(雑草発生前)	200~400	70~100		全面土壌散布	1回		
たまねぎ(移植栽培)		定植前(雑草発生前)	300~500	70~150					
葉たまねぎ		定植後(雑草発生前)但し収穫30日前まで							
らっきょう		定植前(雑草発生前)	200~300	70~100					
ねぎ		定植後(雑草発生前)但し定植10日後まで							
にら		収穫30日前まで(雑草発生前)	300~500	70~150				畦間土壌散布	1回
にんにく		植付前(マルチ前)							
葉にんにく(マルチ栽培)		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	400~500	70~150	全面土壌散布			1回	
葉にんにく(マルチ栽培を除く)		植付前(マルチ前)							
ふき(春どろ露地栽培)		植付後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	300~400	100	畦間土壌散布			2回以内 (土寄せ後の処理は1回以内)	
ふき(ふきのとう)		春期ふき収穫直後から萌芽前まで(雑草発生前)	400	70~150					
かんしょ		挿苗10日後まで(雑草発生前)	200~400	70~100					
さといも		植付後萌芽前(雑草発生前)							
ばれいしょ		土寄せ後(雑草発生前)但し収穫60日前まで	200~300	70~100		全面土壌散布	1回		
やまのいも		植付後萌芽前(雑草発生前)							
しょうが		植付後又は培土後(雑草発生前)但し植付30日後まで	200~400	100					
こんにゃく		は種後出芽前(雑草発生前)	200~300	70~100					
らっかせい		は種後出芽前(雑草発生前)	200~400	70~150					
にんじん、とうもろこし、飼料用とうもろこし		は種後出芽前(雑草発生前)							
ヤングコーン		は種後出芽前(雑草発生前)	300~500	70~100	雑草茎葉散布又は全面土壌散布			1回	
陸稲		生育期(雑草発生前)但し収穫60日前まで							
麦類(大麦、小麦を除く)		は種後(雑草発生前)~小麦2葉期(イネ科雑草1葉期まで)	300	70~150					
大麦		ソルガム3葉期(雑草発生前~発生初期)	300	70~150	全面土壌散布			2回以内 3回以内 (1年間に1回以内)	
小麦		は種後出芽前(雑草発生前)	300~400						
ソルガム		萌芽前(雑草発生前)	200~400	100					
アスパラガス		生育期(雑草発生前)但し収穫90日前まで	300~500	100					
とりかぶと(薬用)		定植前(雑草発生前)	200~400	70~150					
食用ぎく		定植後(雑草発生前)							
きく		萌芽前(雑草発生前)	300~500	100~200					
りんどう		植付後萌芽前(雑草発生前)							
チュウリップ		春期発芽前又は夏切後(雑草発生前)	300~400	2回以内					
桑		収穫60日前まで(雑草発生前)	200~300	70~150		3回以内 (1年間に1回以内)			
おけら		床替後(雑草発生前)	400~500	100~200	1回				
すぎ(床替床)、ひのき(床替床)		萌芽後(雑草発生前)但し収穫120日前まで	100	70~150					
せんきゅう		は種後出芽前(雑草発生前)	300	100	3回以内 (1年間に1回以内)	3回以内 (1年間に1回以内)			
みしまさいこ、とうすげぼうふう、びやくし		定植後(雑草発生前)但し収穫120日前まで							
とうき、いんちんこう		は種後出芽前(雑草発生前)	300	100					
甘草		定植後(雑草発生前)但し収穫90日前まで							
		越冬後萌芽前(雑草発生前)							

作物名	適用雑草名	使用時期	10a当たり使用量(kg)	本剤の使用回数	使用方法	ベンディメタリンを含む農薬の総使用回数		
							麦類、とうもろこし、飼料用とうもろこし	
陸稲、ソルガム		は種後出芽前(雑草発生前)	4~6					
にんじん			4~5					
らっかせい			5					
さといも		植付前(雑草発生前)	4~6	全面土壌散布	1回			
ばれいしょ(マルチ栽培を除く)		植付後萌芽前(雑草発生前)						
ばれいしょ(マルチ栽培)		土寄せ後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで						
キャベツ		植付後マルチ前、但し、萌芽前まで(雑草発生前)	4~5			1回		
はくさい、レタス、非結球レタス		定植前又は定植後~定植翌日(雑草発生前)						
アスパラガス		定植前(雑草発生前)	4~6			2回以内		
にんにく、葉にんにく		萌芽前(雑草発生前)						
たまねぎ(春播栽培)		植付前(マルチ前)	5~6			1回		
たまねぎ(秋播栽培)		植付後(雑草発生前)但し、収穫60日前まで						
たまねぎ(秋播マルチ栽培)		定植後(雑草発生前)但し、収穫30日前まで	4~6			2回以内		
葉たまねぎ		定植後又は生育期(雑草発生前)但し、収穫30日前まで						
ねぎ		定植前(マルチ前)	5~6	1回				
こんにゃく		定植後(雑草発生前)但し、定植10日後まで						
らっかせい		植付後又は培土後(雑草発生前)但し、植付30日後まで	5	2回以内				
バセリ		春期発芽前又は夏切り後(雑草発生前)						
みしまさいこ		は種後出芽前(雑草発生前)	4~6	1回				
チュウリップ		は種後~発芽期又は萌芽期(雑草発生始期まで)						
つつじ類		植付後萌芽前(雑草発生前)	4	畦間土壌散布				
しょうが		生育期(雑草発生前)						
きく		植付後萌芽前(雑草発生前)	5	2回以内 (畦間処理は1回以内)				
いくさ		定植後(雑草発生前)						
うど		畑苗床での定植後(雑草発生前)(入水15日前まで)	5	2回以内 (畦間処理は1回以内)				
		定植後萌芽前(根株養成圃)(雑草発生前)						
		生育期(根株養成圃)(雑草発生前)但し、収穫60日前まで						

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。 ●防除日誌を記載しましょう。