

適用拡大登録のご案内

令和6年5月

農林水産省登録
第20958号

除草剤

バスタ液剤

グルホシネート液剤

令和6年5月29日付けで以下のとおり適用拡大登録されました。

- 作物名「とうもろこし」及び「飼料用とうもろこし」が追加登録されました。
- 作物名「ヤングコーン」が追加登録されました。
- 作物名「さとうきび」が追加登録されました。
- 作物名「ホップ」が追加登録されました。
- 作物名「せり科葉菜類（パセリを除く）」が追加登録されました。
- 既登録作物名「みつば」、「セルリー」及び「とうき（葉）」は「せり科葉菜類（パセリを除く）」の作物群名に統合されました。
- 作物名「水田作物（水田畦畔）」の本剤の使用回数「2回以内」が「3回以内」に、及び、グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数「2回以内」が「3回以内」に変更登録されました。
- 作物名「かんきつ」、「りんご」、「ぶどう」、「なし」、「おうとう」、「かき」、「もも」、「小粒核果類」、「ネクタリン」、「ブルーベリー」、「いちじく」、「びわ」、「キウイフルーツ」、「いちょう（種子）」、「くり」、「水田作物（水田畦畔）」、「水田作物、畑作物（休耕田）」、「さんしょう（果実）」、「たけのこ」及び「花き類・観葉植物」の使用時期から草丈の記載が削除されました。

適用表は次ページ以降のとおり。

【追加事項又は変更該当する作物のみ抜粋(太字下線部)】

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
<u>とうもろこし</u> 飼料用 <u>とうもろこし</u>	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期：は種前 又は畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
<u>ヤングコーン</u>	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期：は種前 又は畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
<u>さとうきび</u>	—	一年生雑草	植付前(雑草生育期)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	1回	雑草茎葉 散布	4回以内 (植付後は 3回以内)
		多年生雑草		500~2000 mL/10a				
		一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期： 畦間処理)	300~500 mL/10a		3回以内		
		多年生雑草	500~2000 mL/10a					
<u>せり科葉菜類</u> (<u>パセリを</u> <u>除く</u>)	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期：定植前 又は畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
<u>ホップ</u>	—	一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期： 畦間処理)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~1000 mL/10a	通常散布 100~150 L/10a 少量散布 30~40 L/10a	3回以内	雑草茎葉 散布	3回以内

【追加事項又は変更該当する作物のみ抜粋(太字下線部)】

(使用時期から草丈の記載を削除)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットPを含む農薬の総使用回数	
				薬量	希釈水量				
かんきつ	-	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a	通常散布 100~150 L/10a 少量散布 30~40 L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内	
		多年生雑草		500~ 1000 mL/10a					
りんご		一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a					
		多年生雑草		500~ 1000 mL/10a					
ぶどう		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a					
		多年生雑草		500~ 1000 mL/10a					
なし おうとう かき もも 小粒核果類 ネクタリン ブルーベリー いちじく		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a					
		多年生雑草		500~ 1000 mL/10a					
びわ キウイフルーツ		一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a					100~150 L/10a
		多年生雑草		500~750 mL/10a					
いちよう (種子)	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a						
	多年生雑草		500~ 1000 mL/10a						
くり	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a						
	多年生雑草		500~750 mL/10a						
水田作物 (水田畦畔)	水田 畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	500~ 1000 mL/10a	通常散布 100~150 L/10a 少量散布 30~40 L/10a	3回 以内	雑草 茎葉 散布	3回以内	
水田作物、 畑作物(休耕 田)	休耕 田		雑草生育期						100~150 L/10a
さんしょう (果実)	-	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	2回 以内		2回以内	
		多年生雑草		500~750 mL/10a					

【追加事項又は変更該当する作物のみ抜粋(太字下線部)】

(使用時期から草丈の記載を削除)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	ゲルネット及びゲルネットIPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
たけのこ	-	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	300~500 mL/10a	100~150 L/10a	2回以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
花き類・ 観葉植物	-		雑草生育期 畦間処理					3回以内

* 使用上の注意事項が変更されました。

(変更後：太字下線部追記事項)

- 本剤は土壌に落下すると速やかに不活性化し、効果を発現しないので薬液が雑草の茎葉全体に均一にかかるように散布すること。

また、雑草が大きくなりすぎると効果が低下するので、草丈30cm以下を目安に時期を失ないように散布すること。但し花き類・観葉植物に使用する場合は草丈20cm以下、休耕田では草丈50cm以下の雑草に散布すること。

使用上の注意事項などについては、製品に貼付されているラベルを参照のこと。

さらに詳しい情報を知りたい方へのお知らせ

【フリーダイヤル】 ☎0120-014-660 【ホームページ】 <https://crop-protection.basf.co.jp/>

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3-4-4 OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660

●情報提供の目的で弊社よりダイレクトメールを発送しております。ご不要の場合はお手数ですがフリーダイヤルまでご一報ください。

®=BASF社の登録商標