

## 殺菌剤

# ロンセラーフロアブル<sup>®</sup>

<sup>®</sup>=BASF社の登録商標



殺菌剤分類 **7**

有効成分

ゼミウム<sup>®</sup>(フルキサピロキサド) …… 26.5%

登録番号：第24822号

性 状：類白色水和性  
粘稠懸濁液体

毒 性：普通物\*

有効年限：5年

包 装：333ml×30本

\*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■特長

- ゼミウム<sup>®</sup>の作用と効果
  - ・親水性と親油性の2つの特長を持ったユニークな立体構造
  - ・高い浸達性により安定した耐雨性と残効性
  - ・優れた予防効果と、治療的効果
  - ・幅広い病害スペクトラム
- 環境への負荷を軽減
  - ・1成分で幅広い病害をコントロール
- 使いやすさ
  - ・1成分剤なので、散布制限回数の影響を低減
  - ・収穫前日まで使用可能
- 高い安全性
  - ・作物や環境、ミツバチに対する高い安全性

## ■適用病害と使用方法

(2023年12月20日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルキサピロキサドを 含む農薬の総使用回数
かんきつ	そうか病 灰色かび病	3000倍	200~ 700ℓ /10a	収穫 前日 まで	3回以内	散布	3回以内
りんご	モニリア病 黒星病 黒点病 赤星病 斑点落葉病 褐斑病 うどんこ病 すす点病 すす斑病						

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	フルキサピロキサドを 含む農薬の総使用回数
なし	赤星病 黒斑病 黒星病	3000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫 前日 まで	3回以内	散布	3回以内
もも類	灰星病 うどんこ病						
小粒核果類	黒星病 灰星病(すもも)						
おうとう	灰星病						

## ⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用に当たっては容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法にあわせて調節してください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用をさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量・使用時期・使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

## ⚠ 安全使用上の注意事項

- 使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

**保 管**…火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない低温な場所に密栓して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、  
またはクリックしてください。

