

# 同じに見えても“選ばれる違い”

フレキシパワーが魅せる、新しい価値



フレキシブル+パワー  
=フレキシパワー

殺菌剤

## ベランティーフロアブル<sup>®</sup>

Powered by Revysol<sup>®</sup> Active

 **BASF**

We create chemistry

# ベランティー®フロアブル

® = BASF社の登録商標



Powered by Revysol® Active

有効成分：レビゾール®(メフェントリフルコナゾール)……34.9%

人畜毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

レビゾール®はフレキシパワーにより、DMI 低感受性菌の疑われるほ場においても安定した効果を示します。

## ベランティー®フロアブルの特長



## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフェントリフルコナゾールを含む農薬の総使用回数	被害防止方法 農薬使用者
りんご	モニリア病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 褐斑病 黒点病 灰色かび病 うどんこ病	8000倍	200~700 ℓ/10a	収穫 14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
なし	うどんこ病 赤星病 黒星病 黒斑病			収穫 前日まで	2回以内			
もも	灰星病 黒星病 うどんこ病				2回以内			
ネクタリン	灰星病 黒斑病			3回以内	3回以内			
おうとう	黒星病 すす斑病 灰色かび病			3回以内	3回以内			
うめ	灰色かび病 黒とう病 うどんこ病			3回以内	3回以内			
ぶどう	灰色かび病 黒とう病 うどんこ病			3回以内	3回以内			

### △ 効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 過度の連用をさげ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください。(耐性菌出現回避)。
- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は、(普及指導センター、)病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

### △ 安全使用上の注意

- アレルギー性反応を起こすおそれがあります。

### 農薬使用者への被害防止方法

- (調製時) りんご、なし：不浸透性手袋。  
 (散布時) りんご(手散布)、なし(手散布)、ぶどう(手散布)：不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣。  
 りんご(乗用型機械散布)、なし(乗用型機械散布)、もも、ネクタリン(手散布)、おうとう、うめ、ぶどう(乗用型機械散布)：長ズボン・長袖の作業衣。  
 保 管：密栓し、直射日光をさげ、食品と区別して、冷涼な場所で保管してください。

●ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。●使用後の空容器はほ場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

※この資料は2024年10月現在の知見に基づき作成したものです。

## BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階  
 ☎0120-014-660 <https://crop-protection.basf.co.jp/>



詳細やSDSは  
WEBでご覧  
いただけます