

殺菌剤

ベランティーフロアブル[®]

[®] = BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **3**

有効成分

レビゾール[®]

(メフェントリフルコナゾール) …… 34.9%

登録番号：第24778号

性 状：類白色～

淡褐色水和性

粘稠懸濁液体

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：125ml×20本



* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■特長

- レビゾール[®]のユニークな構造式(フレキシパワー)により、安定した効果と高い安全性が得られます。
 - ・DMI低感受性菌に対する安定した効果(地域により低感受性菌の発生状況は異なる)。
 - ・作物、哺乳類、有用昆虫に対する安全性。

■適用病害と使用方法

(2025年4月23日現在)

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフェントリフルコナゾールを含む農薬の総使用回数	被害防止方法	
								使用者	
りんご	モニリア病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 褐斑病 黒点病 灰色かび病 うどんこ病	8000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫14日 前まで	3回以内	散布	3回以内		
なし	うどんこ病 赤星病 黒星病 黒斑病								
もも	灰星病 黒星病			収穫前日 まで	2回以内		3回以内		2回以内
ネクタリン	うどんこ病								
おうとう	灰星病 黒斑病								

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフェントリフルコナゾールを含む農薬の総使用回数	被害防止方法
								使用者
うめ	黒星病 すす斑病 灰色かび病	8000倍	200～ 700ℓ /10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	3回以内	
ぶどう	灰色かび病 黒とう病 うどんこ病							
すいか	うどんこ病 つる枯病	4000倍	100～ 300ℓ /10a					
なす	うどんこ病 すすかび病							

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください(耐性菌出現回避)。
- 使用量、使用時期、使用方法を守って下さい。特に初めて使用する場合は、(普及指導センター、)病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- アレルギー性反応を起こすおそれがあります。

農薬使用者への被害防止方法

・調整時

りんご、なし：不浸透性手袋。

・散布時

りんご(手散布)、なし(手散布)、ぶどう(手散布)：不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣。

りんご(乗用型機械散布)、なし(乗用型機械散布)、もも、ネクタリン(手散布)、おうとう、うめ、ぶどう(乗用型機械散布)：長ズボン・長袖の作業衣。

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所で保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

