

殺虫剤

セフィーナ[®]DC

®=BASF社の登録商標

殺虫剤分類 9D

有効成分

アフィドピロペン

..... 4.9%

登録番号：第24663号

性 状：淡黄色～淡黄緑色
澄明水和性油状液体

毒 性：普通物*

有効年限：5年

包 装：250ml×20本
500ml×20本



* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■特長

●天然物由来[※]の吸汁阻害剤 ※有機JAS規格には適合しません。

- ・コウジカビ由来のユニークな化学構造
- ・既存の有機リン、合ピレ、ネオニコチノイド等への抵抗性系統にも有効
- ・IRACグループ9のサブグループDに分類

●環境に優しい

- ・ハチ類への高い安全性
- ・有用昆虫への影響が少ない
- ・魚類、鳥類への毒性が低い

●ウイルス媒介抑制効果

- ・速効的に異常行動を誘発
- ・異常行動による吸汁阻害効果
- ・優れたウイルス媒介抑制効果

●優れた残効性

- ・DC製剤による葉組織内への浸達性
- ・有効成分の物化性による優れた耐雨性
- ・長期残効性

■適用害虫と使用方法

(2024年11月13日現在)

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフィドピロペンを含む農薬の総使用回数
小麦	アブラムシ類	2000～4000倍	60～150ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アフィドピロベンを含む農薬の総使用回数	
ばれいしょ	アブラムシ類	2000～4000倍	100～300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	散布	2回以内	
		500倍	25ℓ /10a					
てんさい		2000～4000倍	100～300ℓ /10a					収穫7日前まで
キャベツ								
はくさい								
ブロッコリー								
レタス								
かぼちゃ								
非結球レタス								

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- ばれいしょに対して希釈倍数500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の速度連動式地上液剤散布装置を使用してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意

- ミストの吸入をさけ、屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- 吸入した場合、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させ、医師の手当を受けさせてください。
- 鍵のかかる場所に保管してください。
- 換気のよいところで保管してください。容器を密閉しておいてください。

保 管…火気をさけ、食品と区別して、直射日光のあたらない低温な場所に密栓して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

