

## 殺菌剤

# シグナム®WDG

®=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 11, 7

有効成分

ピラクロストロビン ..... 6.7%

ボスカリド ..... 26.7%

登録番号：第22290号

性 状：褐色水和性細粒  
及び微粒

毒 性：普通物\*

有効年限：5年

包 装：(100g×10袋)×6箱  
333g×30袋  
500g×20袋



\* 普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

## ■特長

- 作用性の異なる剤を混合することで、うどんこ病、炭疽病、つる枯病、すすかび病、灰色かび病、菌核病、べと病など幅広い病害にすぐれた効果を示します。
- 両有効成分とも葉内に浸達するため残効性、耐雨性にすぐれます。
- 孢子発芽阻害にすぐれ、発病前から発病初期の予防的な散布ですぐれた効果を示します。

## ■適用病害と使用方法

(2025年8月6日現在)

| 作物名  | 適用病害名                                 | 希釈倍数  | 使用液量         | 使用時期    | 本剤の使用回数    | 使用方法             | ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数            | ボスカリドを含む農薬の総使用回数                |
|------|---------------------------------------|-------|--------------|---------|------------|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| ねぎ   | べと病<br>黒斑病<br>さび病                     | 1500倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫7日前まで | 3回以内       | 散布               | 3回以内                            | 3回以内                            |
| たまねぎ | 灰色腐敗病                                 | 500倍  | —            | 定植直前    | 1回         | 5分間<br>苗根部<br>浸漬 | 4回以内<br>(定植前は1回以内、<br>定植後は3回以内) | 4回以内<br>(定植前は1回以内、<br>定植後は3回以内) |
|      | 灰色腐敗病<br>灰色かび病<br>べと病<br>小菌核病<br>白色疫病 | 1500倍 | 100～300ℓ/10a | 収穫7日前まで | 3回以内       | 散布               |                                 |                                 |
| キャベツ | 菌核病<br>株腐病<br>黒斑病                     |       |              |         | 1500～2000倍 |                  |                                 |                                 |
|      | べと病                                   |       |              |         |            |                  |                                 |                                 |

| 作物名          | 適用病害名                                         | 希釈倍数           | 使用液量                 | 使用時期           | 本剤の使用回数     | 使用方法 | ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 |      |
|--------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|-------------|------|----------------------|------------------|------|
| はくさい         | 菌核病<br>炭疽病<br>尻腐病                             | 1500倍          | 100～<br>300ℓ<br>/10a | 収穫7日前<br>まで    | 3回以内        | 散布   | 3回以内                 | 3回以内             |      |
|              | 白斑病<br>黒斑病<br>べと病<br>白さび病                     | 1500～<br>2000倍 |                      |                |             |      |                      |                  |      |
| なす           | 灰色かび病<br>菌核病<br>うどんこ病<br>褐色斑点病<br>褐紋病         | 1500倍          |                      | 収穫前日<br>まで     | 2回以内        |      | 2回以内                 |                  | 2回以内 |
|              | すすかび病                                         | 1500～<br>2000倍 |                      |                |             |      |                      |                  |      |
| トマト<br>ミニトマト | 葉かび病<br>灰色かび病<br>すすかび病<br>うどんこ病<br>菌核病<br>輪紋病 | 2000倍          |                      |                | 3回以内        |      | 3回以内                 |                  | 3回以内 |
| ピーマン         | うどんこ病<br>炭疽病<br>黒枯病<br>灰色かび病<br>斑点病           |                |                      |                |             |      |                      |                  |      |
| とうがらし類       | うどんこ病<br>炭疽病<br>黒枯病<br>灰色かび病                  |                |                      |                |             |      |                      |                  |      |
| すいか          | 炭疽病<br>うどんこ病<br>つる枯病                          | 1500～<br>2000倍 |                      |                | 3回以内        |      | 3回以内                 | 3回以内             | 3回以内 |
|              | 菌核病<br>褐色腐敗病                                  | 1500倍          |                      |                |             |      |                      |                  |      |
| とうがん         | うどんこ病                                         | 2000倍          |                      |                | 2回以内        |      | 2回以内                 | 2回以内             |      |
| かぼちゃ         | うどんこ病                                         | 1500～<br>2000倍 |                      |                | 3回以内        |      | 3回以内                 | 3回以内             | 3回以内 |
|              | つる枯病                                          | 1500倍          |                      |                |             |      |                      |                  |      |
| にんじん         | 黒葉枯病<br>うどんこ病<br>斑点病                          | 2000倍          |                      | 収穫14日前<br>まで   | 2回以内        |      | 2回以内                 | 3回以内             |      |
| にんにく         | さび病<br>白斑葉枯病<br>黄斑病<br>葉枯病                    | 1500倍          |                      | 収穫3日前<br>まで    | 3回以内        |      | 3回以内                 |                  |      |
| レタス          | 灰色かび病<br>菌核病<br>すそ枯病                          |                |                      | 1500～<br>2000倍 | 収穫7日前<br>まで |      | 2回以内                 | 2回以内             | 2回以内 |
|              | べと病                                           |                |                      |                |             |      |                      |                  |      |
| 非結球<br>レタス   | 灰色かび病<br>菌核病<br>すそ枯病                          | 1500倍          |                      | 収穫14日前<br>まで   | 2回以内        |      | 2回以内                 | 2回以内             |      |
|              | べと病                                           | 1500～<br>2000倍 |                      |                |             |      |                      |                  |      |

| 作物名             | 適用病害名             | 希釈倍数           | 使用液量                 | 使用時期                 | 本剤の使用回数 | 使用方法 | ピラクロストロビンを含む農薬の総使用回数 | ボスカリドを含む農薬の総使用回数 |      |    |      |
|-----------------|-------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------|------|----------------------|------------------|------|----|------|
| はなやさい類          | 菌核病<br>黒すす病       | 1500倍          | 100～<br>300ℓ<br>/10a | 収穫7日前<br>まで          | 2回以内    | 散布   | 2回以内                 | 2回以内             |      |    |      |
|                 | べと病               | 1500～<br>2000倍 |                      | 3回以内                 |         |      |                      |                  |      |    |      |
| いちご             | 灰色かび病             | 1500～<br>2000倍 |                      |                      |         |      |                      | 収穫前日<br>まで       | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
|                 | うどんこ病<br>炭疽病      | 2000倍          |                      | 収穫3日前<br>まで          |         |      |                      |                  |      |    |      |
| バジル             | べと病               | 2000倍          |                      | 100～<br>500ℓ<br>/10a |         |      |                      | 収穫前日<br>まで       | 2回以内 | 散布 | 2回以内 |
| アスパラガス          | 茎枯病<br>斑点病<br>褐斑病 | 1500倍          | 100～<br>300ℓ<br>/10a | 収穫7日前<br>まで          |         |      |                      |                  |      |    |      |
| さやえんどう<br>実えんどう | 灰色かび病<br>さび病      | 1500～<br>2000倍 | 100～<br>300ℓ<br>/10a | 収穫7日前<br>まで          |         |      |                      |                  |      |    |      |
| 未成熟<br>とうもろこし   | すす紋病              | 2000倍          |                      |                      |         |      |                      |                  |      |    |      |

## マイナー作物等の登録拡大に伴いグループ化した作物名

| グループ化した作物名 | 含まれる作物(品種)                   |
|------------|------------------------------|
| 非結球レタス     | かきちしゃ、サラダ菜、立ちちしゃ、美味タス、リーフレタス |
| はなやさい類     | カリフラワー、茎ブロッコリー、ブロッコリー        |

農薬登録における作物群の作物名について(2021年1月14日改正)「農薬の適用病害虫の範囲および使用方法に係る適用作物等の名称について」(2019年3月29日付け30消安第6281号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長通知)農林水産消費安全技術センターホームページをご参照ください。  
<http://www.acis.famic.go.jp/shinsei/6281.pdf>

表の使用に際しては以下の事項に留意してください。

注1 現在、農薬の適用作物には含まれていない作物を含みます。適用作物に含まれていない作物については、農薬登録時にその名称が変更される場合があります。

注2 品種名及び栽培条件(施設栽培等)等については省略している場合がありますが、農薬登録時に品種名又は栽培条件等の指定がある場合は、当該品種又は栽培条件等によりのみ使用できるものです。

## ⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 散布液調製の際は、水をかきまぜながら本剤の所定量を徐々に加えてください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- なすに使用する場合、浸透性を高める効果のある展着剤を加用すると薬害が生じるおそれがあるので、さけてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

## 〈非結球レタスについて〉

- 適用作物群に属する作物またはその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

### ⚠ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としとしてください。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

**魚毒性**…水産動植物(魚類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。

使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

浸漬後の薬液は、河川等に流さず、水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

**保管**…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、  
またはクリックしてください。

