

同じに見えても“選ばれる違い”

フレキシパワーが魅せる、新しい価値



フレキシブル+パワー
=フレキシパワー

殺菌剤

ベランティーフロアブル[®]

Powered by Revysol[®] Active

□・BASF

We create chemistry

ベランティー®フロアブル


®=BASF社の登録商標

Powered by Revysol® Active

有効成分：レビゾール®(メフェントリフルコナゾール)… 34.9%
安全性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

レビゾール®はフレキシパワーにより、DMI 低感受性菌の疑われるほ場においても安定した効果を示します。

ベランティー®フロアブルの特長



適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メフェントリフルコナゾールを含む農薬の総使用回数	被害防止方法 農業使用者
りんご	モニリア病 黒星病 赤星病 斑点落葉病 褐斑病 黒点病 灰色かび病 うどんこ病	8000倍	200~700ℓ/10a	収穫 14日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
なし	うどんこ病 赤星病 黒星病 黒斑病			収穫 前日まで	2回以内			
もも ネクタリン	灰星病 黒星病 うどんこ病				2回以内			
おうとう	灰星病 黒斑病	200倍	10ℓ/10a	収穫 前日まで	3回以内	無人航空機 による散布	3回以内	
うめ	黒星病 すす斑病 灰色かび病							
ぶどう	灰色かび病 黒とう病 うどんこ病	8000倍	200~700ℓ/10a	収穫 前日まで	3回以内	散布	3回以内	
すいか	うどんこ病 つる枯病	4000倍	100~300ℓ/10a					
なす	うどんこ病 すすかび病							

△効果・薬害等の注意

- 使用前に容器をよく振ってください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法に合わせて調節してください。
- 過度の連用をさけ、作用性の異なる薬剤と輪番で使用してください。(耐性菌出現回避)。
- 本剤を無人航空機で散布する場合は、次の事項に注意してください。
 - ①散布機種種の散布基準に従って実施してください。
 - ②散布機種種に適合した散布装置を使用してください。
 - ③散布中、薬液が漏れないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行ってください。
 - ④散布薬液の飛散による他の分野への影響に注意して、散布地域の選定に注意し、散布区域内の諸物件に十分留意してください。
 - ⑤散布終了後は以下の注意事項を守ってください。
 - ・使用後の空容器は放置せず、安全な場所に廃棄してください。
 - ・使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。
 - ・散布終了後、機体の装置は十分洗浄してください。また、薬液タンクの洗浄廃液は河川等に流さないでください。

- 使用量、使用時期、使用方法を守ってください。特に初めて使用する場合は、(普及指導センター、)病虫害防除所等関係機関の指導を受けてください。

△安全使用上の注意

- アレルギー反応を起こすおそれがあります。

⚠️ 農薬使用者への被害防止方法

- (調製時) りんご、なし：不浸透性手袋。
(散布時) りんご(手散布)、なし(手散布)、ぶどう(手散布)：不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣。
りんご(乗用型機械散布)、なし(乗用型機械散布)、もも、ネクタリン(手散布)、おうとう、うめ(散布)、ぶどう(乗用型機械散布)：長ズボン・長袖の作業衣。
- 保 管：密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な場所で保管してください。

●ラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。●使用後の空容器はほ場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

※この資料は2026年1月現在の知見に基づき作成したものです。

BASFジャパン株式会社

東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号 OVOL日本橋ビル3階
☎0120-014-660 <https://crop-protection.basf.co.jp/>詳細やSDSは
WEBでご覧
いただけますBASF-0796 3
202601