

殺菌剤

パビンコ[®]フロアブル

Powered by Pavecto[®]Active

®=BASF社の登録商標

殺菌剤分類 **11A**

有効成分

パベクト[®](メチルテトラプロール) …… 9.7%

登録番号：第24789号

性 状：類白色～

淡黄色水和性

粘稠懸濁液体

毒 性：普通物*

有効年限：3年

包 装：500ml×20本



*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

■特長

- FRACコード新規サブグループ「11A」に分類される新規有効成分
- 既存耐性菌に対しても優れた効果を有し、既存薬剤に対し耐性を持つ病害の防除にも有効です
- 茶の主要病害である「炭疽病」をはじめ、「輪斑病」「新梢枯死症」にも優れた効果を発揮します
- 発生初期に散布することで安定した予防効果と治療的効果が期待できます

■適用病害と使用方法

(2026年4月13日現在)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	メチルテトラプロールを含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 黒点病 炭疽病 斑点落葉病 すす点病 すす斑病 褐斑病 輪紋病	1000倍	200～700ℓ /10a	収穫 前日 まで	3回以内	散布	3回以内
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症		200～400ℓ /10a	摘採 14日前 まで	2回以内		2回以内
てんさい	褐斑病		100～300ℓ /10a	収穫 前日 まで	3回以内		3回以内

⚠ 効果・薬害等の注意事項

- 使用前によく振ってから使用してください。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態および散布方法にあわせ調節してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用してください。
- 蚕に対して影響を及ぼすおそれがあるので、養蚕で使用する桑葉にかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗してください。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落してください。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏期高温時の使用をさけてください。

保 管…直射日光をさけ、食品と区別して、なるべく低温な場所に密栓して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。

