

頼れる味方が
戻ってきた!
待望の復活!



脱皮阻害型殺虫剤

カセード®乳剤

特 長

- 1 チョウ目、アザミウマ目、ダニ目、カメムシ目、ハエ目など幅広い害虫に効果!
- 2 優れた残効性
- 3 天敵類に影響が少ない
- 4 EU/台湾向けのりんご・お茶にも使用可能!

100種類以上の適用作物。幅広い殺虫スペクトラム。

■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用 回数
りんご	ナミハダニ、リンゴハダニ	2000	200～ 700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回 以内
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000～ 4000			
	ハマキムシ類	2000～ 6000			
	ヨモギエダシヤク	4000			
なし	ハダニ類、ハマキムシ類	2000		収穫21日前まで	
もも	ハダニ類				
	ハマキムシ類	4000			
	モモハモグリガ	2000～ 4000			
ネクタリン	ハダニ類	2000		収穫14日前まで	
	ハマキムシ類	4000			
小粒核果類	モモハモグリガ	2000～ 4000		収穫7日前まで	
	ケムシ類	4000			
おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000		収穫14日前まで	
かんきつ	ヨモギエダシヤク	2000～ 4000			
	ミカンハモグリガ チャノキロアザミウマ ミカンサビダニ		1000～ 2000		
	かき		カキノヘタムシガ ケムシ類、ハマキムシ類 カキクダアザミウマ		2000～ 4000
マンゴー	チャノキロアザミウマ	2000	収穫3日前まで		
ぶどう	ハスモンヨトウ	4000	収穫30日前まで		
キャベツ	コナガ、アオムシ タマナギンウフバ ハスモンヨトウ、ヨトウムシ シロイチモジヨトウ ハイマダラノメイガ アザミウマ類 オオタバコガ	2000～ 4000	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	
		16～ 24*1	0.8～1.6ℓ /10a*1		
			32*1		1.6～3.2ℓ /10a*1
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000～ 4000	100～300ℓ /10a	収穫14日前まで	
		16～ 24*1	0.8～1.6ℓ /10a*1		
			32*1		1.6～3.2ℓ /10a*1
だいこん	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ	2000～ 4000	100～300ℓ /10a	収穫7日前まで	
		16～ 24*1	0.8～1.6ℓ /10a*1		
			32*1		1.6～3.2ℓ /10a*1
はつかだいこん		4000			1回
わさびだいこん	コナガ	2000～ 4000	100～300ℓ /10a	収穫21日前まで	3回 以内
非結球あぶらな 科葉菜類 (なばな類を除く)	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000			2回 以内
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000～ 4000			3回 以内

■使用方法：散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
ブロッコリー	コナガ	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
	アオムシ	32*1	1.6ℓ/10a*1		
	ハスモンヨトウ	64*1	1.6~3.2ℓ/10a*1		
レタス	ハスモンヨトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内
	オオタバコガ				
	ヨトウムシ				
トマト	ハスモンヨトウ	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内
	トマトサビダニ、コナジラミ類				
	マメハモグリバエ				
ミニトマト	オオタバコガ	2000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
	ミカンキアザミウマ				
	トマトハモグリバエ				
なす	マメハモグリバエ、ハダニ類	2000~4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内
	ミナミキアザミウマ				
	カメムシ類、オオタバコガ				
ピーマン	ミナミキアザミウマ	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内
ししとう	オオタバコガ	2000			
甘長とうがらし	ミナミキアザミウマ	4000			
せり科葉菜類(みつば、パセリ、セルリーを除く)	ハスモンヨトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内
	ゆきのした				
	ふだんそう				
パセリ	セルリー	マメハモグリバエ	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内
セルリー	コナジラミ類	ハスモンヨトウ			
みつば	ハスモンヨトウ	2000			
ねぎ	シロイチモジトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内
	ネギハモグリバエ				
	ネギアザミウマ				
いちご	シロイチモジトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内
	ネギハモグリバエ				
	ネギアザミウマ				
きゅうり	ハスモンヨトウ、アザミウマ類	4000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	4回以内
	クロバネキノコバエ類				
	ミナミキアザミウマ				

*1 使用方法：無人航空機による散布

■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用回数
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ	2000～ 4000	100～ 300ℓ /10a	収穫7日前まで	4回以内
	シロイチモジヨトウ	4000			
メロン	ミナミキイロアザミウマ	2000～ 4000	2000		
	タバココナジラミ類 (シルバーリーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000			
かぼちゃ	トマトハモグリバエ	16*1	0.8ℓ /10a*1	収穫前日まで	3回以内
		16～ 32*1	1.6ℓ /10a*1		
		32～ 64*1	3.2ℓ /10a*1		
うり類(漬物用) (しろうり、 とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000		収穫3日前まで	1回
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで	
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで	
にがり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000～ 4000	100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで	4回以内
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000			
未成熟 とうもろこし	ツマジロクサヨトウ アワノメイガ オオタバコガ	2000～ 4000 4000			2回以内
てんさい	ヨトウムシ	2000～ 4000	25ℓ /10a 1.6ℓ /10a*1	収穫7日前まで	4回以内
	シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシクロハモグリバエ	4000			
	ヨトウムシ	1000			
	ヨトウムシ シロオビノメイガ テンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシクロハモグリバエ	32～ 64*1			
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000	100～ 500ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000～ 4000		収穫7日前まで	
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウナガコナダニ アシクロハモグリバエ	4000	100～ 300ℓ /10a	収穫3日前まで	3回以内
そらまめ 未成熟そらまめ	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	2000			
さやいんげん	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ	4000 2000			
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ	4000		収穫前日まで	2回以内
未成熟さやげ つるむらさき	ハスモンヨトウ				
未成熟ふじまめ		3000			

*1 使用方法：無人航空機による散布

*2 みょうが(花穂)の使用方法：散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により
散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。
●小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置
せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

BASFジャパン株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町3丁目4番4号
OVOL日本橋ビル3階 ☎0120-014-660
https://crop-protection.basf.co.jp/



詳細はWEBでも
ご覧いただけます。

■使用方法：散布

作物名	適用害虫名	希釈倍数 (倍)	使用液量	使用時期	使用回数	
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000	100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで	2回以内	
だいず	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類 ハダニ類 マメシクイガ フタスジヒメハムシ ダイズサヤタマハエ ツメクサガ			32*1		0.8ℓ /10a*1
	あずき	アズキノメイガ ハスモンヨトウ ハダニ類	4000			
16～ 32*1			0.8ℓ /10a*1			
32～ 64*1			1.6ℓ /10a*1			
オクラ	オオタバコガ ハスモンヨトウ	2000～ 4000	100～ 300ℓ /10a	収穫前日まで		3回以内
みょうが (茎葉)	ハスモンヨトウ ハダニ類	2000		みょうが(花穂)の 収穫前日まで 但し、花穂を収穫し ない場合にあっては 開花期終了まで		
みょうが (花穂)*2				収穫前日まで		
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (パジルを除く) タラゴン 食用トレニア	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ ヨトウムシ クロバネキノコバエ類 ネギアザミウマ ネギハモグリバエ アザミウマ類	4000		200～ 300ℓ /10a	収穫3日前まで	2回以内
パジル						
にんじん						
たまねぎ			3回以内			
にら			収穫前日まで		2回以内	
かんしょ	ハスモンヨトウ ナカジロシタバ	16～ 32*1	0.8ℓ /10a*1	収穫7日前まで		
		32～ 64*1	1.6ℓ /10a*1			
食用ミニバラ	ミカンキイロアザミウマ	2000	100～ 300ℓ /10a	収穫3日前まで	2回以内	
きく(葉)	アザミウマ類 ハスモンヨトウ	4000		収穫14日前まで		
食用ぎく	マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ	2000	200～ 700ℓ /10a	収穫7日前まで		
食用さくら(葉)	アザミウマ類	4000		200～ 400ℓ /10a		摘採7日前まで
茶	チャノコカクモンハマキ チャノボンガ チャノミドリヒメコノバイ チャハマキ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ チャトゲコナジラミ					
	さつき		ツツジゲンノバイ チュウレンジノリバチ			
	きく ガーベラ		マメハモグリバエ ミカンキイロアザミウマ		2000	
	ばら		ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ		1000 2000	
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ		4000		100～ 300ℓ /10a	
スターチス	ハスモンヨトウ	2000				
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ					
宿根アスター	シロイチモジヨトウ					
はばたん	コナガ					
けいとう	シロオビノメイガ					
カーネーション ほおずき	タバコガ					
りんどう	リンドウホソハマキ	4000	100～ 700ℓ /10a			

このチラシの記載内容は2026年8月現在のものです。