We create chemistry

てんさい用除草剤

フィールドスター®P Duo 水和剤

®＝BASF社の登録商標

除草剤分類 15,5

有効成分
ジメテナミドP …… 15.4%
レナシル …… 19.2%

登録番号：第24635号
性　　状：類白色～淡褐色水和性粉末
毒　　性：普通物＊
有効年限：５年6箇月
包　　装：1.2kg×10袋



＊普通物：毒劇物に該当しないものを指していう通称

■特長

●実績のある2成分が、幅広い草種に対し安定的な効果を示します。

●本剤は300g／10aで高い除草効果が確認されています。

●雑草の発生状況に応じて既存の茎葉処理剤と組み合わせてご使用ください。

■適用雑草と使用方法

（2026年10月7日現在）

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法
			薬量	希釈水量		
てんさい（移植栽培）	一年生雑草	定植後又は中耕後（雑草発生前～発生始期）但し、収穫60日前まで	300～500g/10a	80～100ℓ/10a	2回以内	雑草茎葉散布又は全面散布
てんさい（直播栽培）		てんさい6葉期以降又は中耕後（雑草発生前～発生始期）但し、収穫60日前まで				

ジメテナミド及びジメテナミドPを含む農薬の総使用回数	レナシルを含む農薬の総使用回数
2回以内	3回以内（定植後又は出芽後の処理は2回以内）

⚠ 効果・薬害等の注意事項

●展着剤（非イオン系）を加用してください。

●薬液は十分かきまぜ、また時々攪拌しながら散布してください。

●砂地で水はけのよい畑では使用をさけてください。

●本剤の散布適期は雑草の発生前～発生始期であり、生育の進んだ雑草には効果が劣るので、使用時期を失しないように散布してください。

●高温時の散布は薬害を生じるおそれがあるので注意してください。

●散布に当たっては、他作物に飛散しないよう十分注意してください。

●散布むらのないように均一に散布してください。

●散布直後の多量の降雨は薬害のおそれがあるので、天候を見きわめてから散布してください。

●土壌が極端に乾燥している場合には、除草効果が劣ることがあるので、土壌が適度の水分を含んでいるときに使用してください。

●本剤は残効性が長く、後作物に対して影響を及ぼすことがあるので注意してください。特に、いね科、まめ科、うり科、なす科及びあぶらな科作物等では影響が認められているので、本剤処理後6ヶ月以内にこれらを後作物として栽培しないでください。

●使用後、容器や散布器具は必ず十分水で洗ってください。

●使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。

●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないよう注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けてください。

⚠ 安全使用上の注意事項

●誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。

●本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

●散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。

●作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

●かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

魚毒性等…水産動植物（藻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使い切ってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保　　管…直射日光を避け、なるべく低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

さらに詳しい製品情報はこちらから

※QRコードを読み込む、
またはクリックしてください。